

メディリートクリーム

◆メディリートクリームは、ミコナゾール硝酸塩を主成分とした外陰用の治療薬です。■ミコナゾール硝酸塩は、腔カンジダの原因であるカンジダ菌を殺菌し、腔カンジダによる諸症状を改善します。■メディリートクリームは、腔カンジダの再発による、発疹を伴う外陰部のかゆみに効果を発揮します。

効能・効果

腔カンジダの再発による、発疹を伴う外陰部のかゆみ（過去に医師の診断・治療を受けた方に限る）
ただし、腔症状（おりもの、熱感等）を伴う場合は、必ず腔剤（腔に挿入する薬）を併用してください
本剤はカンジダによる外陰部の症状を改善しますが、腔内の治療を行うものではありません。
外陰部の症状は、腔の中にいるカンジダ菌が外陰部に影響を及ぼすことによって起こる疾病で、かゆみの他、発疹、熱感を生じます。
外陰部皮膚に発赤やただれ等の発疹を伴うかゆみがあらわれた場合にお使いください。

用法・用量

成人（15歳以上60歳未満）、1日2～3回、適量を患部に塗布してください。
ただし、3日間使用しても症状の改善がみられないか、6日間使用しても症状が消失しない場合は、医師の診療を受けてください。
外陰部症状のみの場合：本剤を使用してください。腔剤（腔に挿入する薬）との併用が望まれます。
腔症状（おりもの、熱感等）を伴う場合：本剤に腔剤（腔に挿入する薬）を併用してください。
定められた用法・用量を厳守してください。
腔周辺（外陰）にのみ使用してください。
目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
使用前によく手を洗ってください。
生理中の使用は避け、使用中に生理になった場合は本剤の使用を中止してください。その場合は治癒等の確認が必要であることから医師の診療を受けてください。（生理中は薬剤が流れ出し、効果が十分得られない場合があります）
ご使用前に入浴するか、ぬるま湯で患部を清潔にし、使用してください

成分及び分量

1g中
ミコナゾール硝酸塩 10mg

添加物

ポリオキシエチレンセチルエーテル,自己乳化型モノステアリン酸グリセリン,パラベン,ミスチン酸イソプロピル,流動パラフィン,セタノール

使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
次の人は服用しないでください
初めて発症したと思われる人。（初めて症状があらわれた場合は、他の疾病が原因の場合があり、その場合は医師の診断を受ける必要があります）
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。（本剤の使用により再びアレルギー症状を起こす可能性があります）
15歳未満又は60歳以上の人。（15歳未満の人は初めて発症した可能性が高く、また60歳以上の人には他の疾患の可能性や他の菌による複合感染の可能性があるため）
妊婦又は妊娠していると思われる人。（薬の使用には慎重を期し、専門医に相談して指示を受ける必要があります）
発熱、悪寒、下腹部痛、背中や肩の痛み、色のついた又は血に染まったおりもの、魚臭いおりもの、生理の停止、腔からの不規則又は異常な出血、腔又は外陰部における潰瘍、浮腫又はただれがある人。（別の疾病の可能性があるので、医師の診断を受ける必要があります）
次の診断を受けた人。
糖尿病（頻繁に本疾病を繰り返す可能性が高いので、医師の診断を受ける必要があります）
ワルファリン等の抗凝血剤を服用している人。（ワルファリンの作用である出血傾向が強くなる場合があります）
本疾病を頻繁に繰り返している人。（1～2か月に1回又は6か月以内に2回以上）
腔カンジダの再発がわからない人。（自己判断できない場合は、医師の診断を受ける必要があります）
次の部位には使用しないでください。
腔周辺（外陰）以外の部位。（本剤は外陰部以外に使用する製品ではありません）

相談すること

次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
医師の治療を受けている人。
（医師から処方されている薬の作用に影響がでることもあります。）
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
（薬などでアレルギー症状を起こしたことがある人は、本剤でもアレルギーを起こすことがあります。）
授乳中の人。（薬の使用には慎重を期す必要があります）
使用后、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
腔周辺の皮膚（外陰）：かゆみ、発疹・発赤、かぶれ、熱感、びらん、刺激感、小水疱、はれ、乾燥・亀裂、落屑
（本剤によるアレルギー症状であるか、本剤の薬理作用が強くあらわれたものであると考えられ、このような場合、同じ薬を続けて使用すると症状がさらに悪化するおそれがあります）
3日間使用しても症状の改善がみられない場合又は6日間使用しても症状が消失しない場合は、医師の診療を受けてください。（症状が重いか他の疾病

による可能性があります)

特に、クリーム単独使用の場合は、自己判断で治療をすることなく医師の診療を受けてください。(症状が重いか他の疾病による可能性があります)

保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

小児の手のとどかない所に保管してください。

他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)

コンドームやペッサリー等の避妊用ラテックス製品との接触を避けてください。(これらの製品が劣化・破損することがあります)

使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)

41

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。