

NARON m

- ◆NARON m 은 발열 및 두통, 생리통 등의 통증을 가라앉혀주는 아세트아미노펜을 배합한 해열진통제입니다.
- ◆위점막을 보호하는 글리신과 발열 시에 쉽게 소모되는 비타민 B₁ 및 B₂를 배합하고 있습니다.
- ◆7 세 이상부터 가족과 함께 복용할 수 있습니다.
- ◆졸음을 유발하는 성분을 포함하지 않습니다.

효능

- ◆오한·발열 시의 해열
- ◆두통·월경통 (생리통)·치통·발치 후 동통·요통·어깨 결림통·근육통·관절통·타박통·염좌통·골절통·외상통·신경통·인후통·이통의 진통

용법 및 용량

다음의 양을 가급적 공복 시를 피하여 찬물 또는 미지근한 물과 함께 복용하십시오. 복용 간격은 4 시간 이상 두십시오.
성인 (15 세 이상), 1 회 2 정, 1 일 3 회까지
7 세~14 세, 1 일 1 정, 1 일 3 회까지
7 세 미만, 복용하지 말 것

주의

- 정해진 용법·용량을 엄수해 주십시오.
- 소아에게 복용하게 할 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용하도록 하십시오.

정제 꺼내는 법

정제가 들어 있는 PTP 시트의 철부를 손가락 끝으로 강하게 눌러 뒷면의 알루미늄 포일을 뚫은 후, 정제를 꺼내어 복용하십시오. (잘못하여 시트를 그대로 삼키면 식도 점막에 찢히는 등 불의의 사고로 이어질 수 있습니다)

성분

In 2 tablets

아세트아미노펜 300mg

글리신 300mg

티아민 질산염 (비타민 B₁) 8mg

리보플라빈 (비타민 B₂) 4mg

첨가물

무수 규산, 셀룰로오스, 메타규산알루미늄산마그네슘, 하이드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 마그네슘스테아레이트

주의

- 본제의 복용으로 인해 소변 색깔이 노래지는 경우가 있으나, 이는 약에 포함되어 있는 비타민 B₂가 흡수됨에 따른 것으로 걱정하실 필요 없습니다.
- 정제에 따라서는 비타민 B₂ 성분에 의한 붉은 반점이 나타날 수 있지만, 효과는 다르지 않습니다.

사용상의 주의

해서는 안 되는 것

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용·사고가 일어나기 쉽습니다)

- 다음에 해당하는 사람은 복용하지 마십시오
본제 또는 본제의 성분에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.
본제 또는 다른 해열 진통제, 감기약을 복용하여 천식을 일으킨 적이 있는 사람.
- 이 약을 복용하는 동안은 다음 중 어떤 의약품도 복용하지 않을 것
다른 해열 진통제, 감기약, 진정제
- 복용 전후는 음주하지 마십시오
- 장기간 계속해서 사용하지 마십시오

상담할 내용

- 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 치과의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것
의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.
임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람.
고령자.
약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.
다음의 진단을 받은 사람.

심장병, 신장병, 간장병, 위·십이지장 궤양

- 복용 후 다음의 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오
피부: 발진·발적, 가려움
소화기: 메스꺼움 및 구토, 식욕부진
정신신경계: 현기증
기타: 과도한 체온 저하
- 드물게 다음과 같은 심각한 증상이 일어날 수 있다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받을 것.
쇼크 (아나필락시스): 복용 후 즉시 피부 가려움증, 두드러기, 목쉼소리, 재채기, 인후 가려움증, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타난다.
피부 점막안 증후군 (스티븐스-존슨 증후군), 중독성 표피 괴사 용해증, 급성 범발성 발진성 농포증: 고열, 눈 충혈, 눈곱, 입술 진무름, 인후 통증, 피부의 광범위한 발진·발적, 빨개진 피부에 작고 도돌한 것 (작은 농포) 이 생김, 전신의 나른함, 식욕이 없는 증상 등이 지속되거나 급격히 악화된다.
간 기능 장애: 발열, 가려움증, 발진, 황달 (피부와 눈 흰자위가 노랗게 되는 증상), 갈색뇨, 전신의 나른함, 식욕 부진 등이 나타난다.
신장 장애: 발열, 발진, 소변량 감소, 전신 부종, 전신의 나른함, 관절통 (마디마디가 아픈 증상), 설사 등이 나타난다.
간질성 폐렴: 계단을 오르거나, 조금 무리하면 호흡 곤란·숨이 참, 마른 기침, 발열 등을 보이며, 이들 증상이 갑자기 나타나거나 지속된다.
천식: 숨을 쉴 때 색색, 휘휘과 같은 소리가 나며, 답답함 등의 증상을 보인다.
- 5~6 회 복용해도 증상이 좋아지지 않는 경우는 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 치과의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

보관 및 취급상의 주의

- 직사광선이 닿지 않는 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. (오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다)
- 사용기한을 경과한 제품은 복용하지 마십시오. 또한, 사용기한을 초과하지 않아도 일단 개봉한 후에는 6개월 이내에 복용하십시오. (품질유지를 위하여)

11

【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.