

# NARON m

- ◆NARON m 是含有乙醯胺酚成分的止痛退燒藥，能舒緩發燒、頭痛、生理痛等痛楚。
- ◆配合了保護胃黏膜的甘氨酸，以及發燒時容易消耗的維生素 B<sub>1</sub> 和 B<sub>2</sub>。
- ◆7 歲起全家可以服用。
- ◆不含嗜睡成分。

## 療效

- ◆惡寒、發燒時的解熱
- ◆頭痛、月經痛(生理痛)、牙痛、拔牙後的疼痛、腰痛、肩膀痠痛、肌肉疼痛、關節痛、撞傷痛、扭傷痛、骨折痛、外傷痛、神經痛、咽喉痛、耳朵痛的鎮痛

## 用法及用量

請用冷水或微溫水服用以下用量，並盡量避免於空腹時服用。請每隔 4 小時以上服用。

成人 (15 歲以上)，1 次 2 片，1 天最多 3 次

7 歲~14 歲，1 次 1 片，1 天最多 3 次

未滿 7 歲者，請勿服用

### 注意事項

- 請務必遵守規定用法、用量。
- 兒童服用時，請於家長的指導監督下使用。

### 錠劑取出方法

指尖用力按下裝有藥片的 PTP 板的凸出部，弄破背面的鋁箔再取出服用。(以包裝的狀態直接誤吞，會發生穿破食管粘膜等意外事故)

## 成分

2 片中

乙醯胺酚 300mg

甘氨酸 300mg

硝酸硫胺 (維生素 B<sub>1</sub>) 8mg

核黃素 (維生素 B<sub>2</sub>) 4mg

### 添加劑

二氧化矽，纖維素，矽酸鋁鎂，羥丙基纖維素，羧甲基澱粉鈉，硬脂酸鎂

### 注意事項

- 因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色，此為本藥劑所含維生素 B<sub>2</sub> 的影響，無須擔憂。
- 藥錠因含維生素 B<sub>2</sub> 成分，可能會出現紅點，但不會影響其功效。

## 使用上的注意事項

### 禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外)

- 下列的人請勿服用
  - 曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。
  - 曾服用本藥劑或其他解熱鎮痛藥、感冒藥，引發氣喘的人。
- 服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品
  - 其他解熱鎮痛藥、感冒藥、鎮靜藥
- 服用前後請勿飲酒
- 請勿長期連續服用

### 諮詢事項

- 下列的人於服用前，請諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者
  - 正在接受醫師或牙科醫師治療的人。
  - 孕婦或可能懷孕的人。
  - 年長者。
  - 曾因藥品等，引發過敏症狀的人。
  - 接受過下列診斷的人。
    - 心臟病，腎臟病，肝臟病，胃潰瘍，十二指腸潰瘍

●服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：發疹、發紅，發癢

消化系統：惡心、嘔吐、食欲不振

精神神經系統：頭暈

其他：過度的體溫低下

●極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

休克（過敏性）：服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。

史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死鬆解症、急性廣泛性發疹性膿疱症：發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹・發紅、變紅的皮膚上出現小顆粒（小膿疱）、全身倦怠、沒有食欲等持續，或者突然惡化。

肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。

腎功能障礙：出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛（各關節疼痛）、腹瀉等。

間質性肺炎：爬樓梯或稍微勉強身體，就會突然出現氣短・呼吸困難、乾咳、發燒等，或者持續這些症狀。

氣喘：呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。

●服用 5～6 次症狀仍未見改善時，請停止服用並攜帶本說明書諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

## 保管及使用上的注意事項

- ・請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。
- ・請置於兒童無法觸及之處保管。
- ・請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）
- ・請勿服用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請於 6 個月內服用完畢。（為確保品質）

11

### 【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- ・本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- ・多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- ・多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- ・供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。