

服用前请务必阅读本说明书。  
请妥善保管,以便在需要时能随时阅读。



用于缓解头痛、痛经、发热

**NARON TABLETS** 2类药品

〈解热镇痛药〉

- ◆NARON TABLETS是一种用于缓解头痛、牙痛、痛经等症状的解热镇痛药。通过对乙酰氨基酚、乙水杨酸的解热镇痛作用,以及溴米索伐的镇静作用,有效缓解上述疼痛。
- ◆本品为不含吡唑酮类药物的解热镇痛药。



## 使用注意事项



## 禁止事项



(若不遵守则会导致当前症状恶化,或容易发生不良反应和事故)

- 1 下述人群请勿服用**
  - 因本品或本品的成分发生过敏症状者。
  - 服用本品或其他解热镇痛药、感冒药引起哮喘者。
- 2 服用本品期间,请勿服用以下任一药品**  
其他解热镇痛药、感冒药、镇静药、晕车药
- 3 服用后请勿驾驶操作交通工具或机械类**  
(可能会出现思睡等情况)
- 4 服用前后请勿饮酒**
- 5 请勿长期连续使用**
- 6 请勿过量服用\***



## 咨询事项

- 1 下述人群请在服用前咨询医生、牙科医生、药剂师或注册销售商**
  - 正在接受医生或牙科医生治疗者。
  - 孕妇或可能怀孕的人。
  - 患有或疑似患有水痘或流感的婴儿、幼儿及儿童(未满15岁)。
  - 老年人。
  - 曾因药物等发生过敏症状者。
  - 接受以下诊断者。  
心脏病、肾病、肝病、胃溃疡或十二指肠溃疡
- 2 服用后若出现下述症状,则可能存在不良反应,请立即停止服用,并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售商**

相关部位	症状
皮肤	皮疹和发红、发痒
消化系统	恶心和呕吐、食欲不振
精神神经系统	眩晕
其他	体温过低

可能会偶尔出现右侧的严重症状。此时请立即就医。

症状名称	症状
休克 (过敏反应)	服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音嘶哑、喷嚏、喉咙发痒、憋闷、心悸、意识混浊等。
皮肤黏膜眼综合征 (Stevens-Johnson综合征)、中毒性表皮坏死松解症、急性泛发性发疹性脓疱病	高热、眼睛充血、眼垢、唇部糜烂、喉咙痛、皮肤大面积皮疹和发红、变红的皮肤上出现细小粒状物(小脓包)、浑身发倦、无食欲等持续或急剧恶化。
药物超敏反应综合征	出现皮肤大面积发红、全身性皮疹、发热、浑身发倦、淋巴结(颈部、腋下、腹股沟等)肿大等。
肝功能损害	出现发热、发痒、皮疹、黄疸(皮肤或眼白发黄)、小便黄赤、浑身发倦、食欲不振等症状。
肾损害	出现发热、皮疹、尿量减少、全身浮肿、浑身发倦、关节痛(各关节都痛)、腹泻等。
间质性肺炎	爬楼梯或稍微用力时,会感到气短和憋闷、出现干咳、发热等症状,并且这些症状可能突然出现,也可能持续存在。
哮喘	呼吸时发出鼾声和啼鸣声,出现憋闷等。

- 3 服用后可能出现下述症状,若观察到这类症状持续或加剧,请停止服用,并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售商思睡**
- 4 如果服用5~6次症状仍未改善,请停止服用,并携带本说明书咨询医生、牙科医生、药剂师或注册销售商**

## 功效

- ◆ 用于头痛、牙痛、拔牙后的疼痛、月经痛（痛经）、神经痛、肌痛、腰痛、肩肌僵直疼痛、关节痛、咽喉痛（咽痛）、耳痛、挫伤痛、骨折痛、扭伤所致疼痛（扭伤痛）、外伤痛的镇痛
- ◆ 用于寒战（发热引起的发冷）、发热时的解热



头痛



痛经





发热



牙痛

## 用法用量

请尽量避免空腹，用水或温水服用以下剂量。  
请间隔4小时以上服用。

年龄	1次量	服用次数
15岁及以上	2片 	每天最多3次
8岁~14岁	1片 	
未滿8岁	请勿服用	

### [注意事项]

- (1) 请严格遵守规定的用法用量。
- (2) 儿童使用时，请在监护人的指导监督下使用。
- (3) 片剂的取出方法

如图所示，以指尖用力按压装有片剂的PTP板凸起部分，弄破背面的铝箔，取出药片服用。（如果误吞包装，可能会导致刺破食管黏膜等意外事故发生）

〈片剂取出示意图〉



## 成分

2片中

成分	含量	作用
对乙酰氨基酚	265 mg	解热和镇痛，如发热、头痛、牙痛、痛经等。
乙水杨胺	300 mg	通过镇静作用缓解疼痛。
溴米索伐	200 mg	通过镇静作用，辅助对乙酰氨基酚等的镇痛作用。
无水咖啡因	50 mg	缓解头痛。

辅料：纤维素、羧甲纤维素钙、羟丙基纤维素、硬脂酸镁、硬化油

## 储存及操作注意事项

- (1) 请存放在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。
- (2) 请存放在儿童接触不到的地方。
- (3) 请勿更换其他容器。（否则会导致误用或变质）
- (4) 请勿服用过期产品。



## 避免空腹服用

☆ 一般而言，抑制发热及疼痛的成分可能会刺激胃部。请尽量在服用前进食或饮用饮品。



### [关于多语言产品信息时的免责声明]

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。