

NARON TABLETS

- NARON TABLETS 是适于被头痛、牙痛、痛经等困扰的人群服用的解热镇痛药。通过 acetaminophen、ethenzamide 的解热镇痛作用、bromoalanylurea 的镇静作用可以有效地缓解这些疼痛。
- 本药剂为不含 pyrine 类药物的止痛退烧药。

效能

- 头痛、牙痛、拔牙后的疼痛、痛经（生理痛）、神经痛、肌肉痛、腰痛、肩部酸痛、关节痛、咽喉痛（喉咙疼痛）、耳痛、跌打痛、骨折疼痛、扭伤伴随的疼痛（扭伤痛）、外伤疼痛的镇痛
- 恶寒及发烧时的解热

用法及用量

请尽量避免空腹时，按以下用量并配合水或温开水服用。但是，服用间隔时间为 4 小时以上。

15 岁以上，1 次 2 片，1 天最多 3 次

8 岁~14 岁，1 次 1 片，1 天最多 3 次

未满 8 岁，请勿服用

注意

- 请严格遵守规定的用法用量。
- 儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。

药片的取用方法

以指尖用力按压药片 PTP 包装凸出部位，使铝箔背模破裂后取出药片服用。（不慎误食包装将可能造成刺伤食道黏膜等意外事故发生）

成分

2 片中

乙酰氨基酚 265mg

止痛灵 300mg

溴米索伐 200mg

无水咖啡因 50mg

添加剂

纤维素，羧甲基纤维素钙，羟丙基纤维素，硬脂酸镁，硬化油

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故）

- 下述人群不要服用

因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群。

因服用本药剂或其他解热镇痛药、感冒药而引发过哮喘的人群。

- 在服用本药剂期间，不要服用下述任何药品

其他解热镇痛药、感冒药、镇静药、晕车药

- 服用后不要驾驶交通工具或操作机械类

（会出现嗜睡症状）

- 请不要在服用前后饮酒

- 不要长期连续服用

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师或牙科医师治疗的人群。

孕妇或有其可能性的人群。

患有水痘、流感或有其可能性的婴幼儿及儿童（未满 15 岁）。

老年人。

因药物等出现过过敏症状的人群。

接受以下诊断的人群。

心脏病，肾脏病，肝脏病，胃及十二指肠溃疡

- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

皮肤：起疹、发红，发痒

消化器官：恶心、呕吐、食欲不振

精神神经系统：头晕

其他：体温过低

●偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

休克（过敏性）：服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。

史提芬强症候群、中毒性表皮坏死松解症、急性泛发性发疹性脓疱病：高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大面积起疹、发红、发红皮肤上出现小脓包、全身无力、没有食欲等症状持续或急剧恶化。

药物超敏反应综合征：出现皮肤大面积发红、全身性起疹、发烧、身体疲倦、淋巴结（颈部、腋窝、腹股沟等）肿大等症状。

肝功能障碍：出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。

肾损伤：出现发烧、尿量减少、全身浮肿、全身无力、关节痛（各关节疼痛）、腹泻等症状。

间质性肺炎：上楼或因劳累而出现气短、气闷、空咳嗽、发烧，并且突然出现或长时间持续。

哮喘：呼吸时出现哮鸣音、气闷等情况。

●服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

嗜睡

●即使服用5~6次仍不见症状好转时，请停止服用，并携带本说明书咨询医生、牙科医生、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

- 请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）
- 请勿使用超过期限的产品。

71

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。