

服用前請務必閱讀本說明書。  
此外，請妥善保管以備不時之需。



用於頭痛、生理痛、發燒

**NARON TABLETS** 第2類醫藥品

〈解熱鎮痛藥〉

- ◆ **NARON TABLETS** 為舒緩頭痛、牙痛、生理痛的解熱鎮痛藥。透過乙醯胺酚與鄰乙氧苯甲酰胺的解熱鎮痛作用、溴化羥草酸尿素的鎮靜作用，有效緩解上述疼痛。
- ◆ 本藥劑為不含比林類藥物的解熱鎮痛藥。



## 使用上的注意事項



### 禁止事項



(若不遵守，可能導致目前的症狀惡化，或者容易引發副作用、意外)

- 1 符合下列情形者請勿服用**
  - (1) 曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。
  - (2) 曾因服用本藥劑或其他解熱鎮痛藥、感冒藥而引起氣喘者。
- 2 服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品**  
其他解熱鎮痛藥、感冒藥、鎮靜藥、暈車藥
- 3 服用後請勿駕駛交通工具或操作機械**  
(可能出現嗜睡等)
- 4 服用前後請勿飲酒**
- 5 請勿長期連續使用**
- 6 請勿過量服用\***



## 諮詢事項

- 1 下列人士服用前，請先諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者**
  - (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療者。
  - (2) 孕婦或可能懷孕者。
  - (3) 正患有水痘或流感，或懷疑感染上述疾病的嬰兒、幼兒、兒童（未滿15歲者）。
  - (4) 老年人。
  - (5) 曾因藥物等引發過敏症狀者。
  - (6) 受診斷為患有下列疾病者。  
心臟病、腎臟病、肝臟病、胃潰瘍、十二指腸潰瘍
- 2 服用後，出現下列症狀即可能為副作用，請立即停止服用，並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者**

相關部位	症狀
皮膚	出疹、發紅、發癢
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振
精神神經系統	暈眩
其他	體溫過低

曾發生如右罕見嚴重症狀。如遇到此類情況，請立刻接受醫師診療。

症狀名稱	症狀
休克 (過敏性)	服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。
史蒂芬強森症候群、 中毒性表皮壞死融 解症、急性廣泛性 發疹性膿疱症	發高燒、眼睛充血、尿尿、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍出疹、發紅、變紅的皮膚上出現小顆粒(小膿疱)、全身倦怠、沒食慾等症狀持續，或者突然惡化。
藥物過敏症候群	出現皮膚大範圍發紅、全身出疹、發燒、倦怠感、淋巴結(頸部、腋下、鼠蹊部)腫脹等。
肝功能障礙	出現發燒、發癢、出疹、黃疸(皮膚和眼白變黃)、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等情況者。
腎功能障礙	出現發燒、出疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛(各關節疼痛)、腹瀉等。
間質性肺炎	爬樓梯或稍微勉強身體，就會突然出現氣短、呼吸困難、乾咳、發燒等，或者持續這些症狀。
氣喘	呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。

- 3 服用後可能出現下列症狀，如該症狀持續或加劇，請停止服用，並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者**  
嗜睡
- 4 服用5~6次後症狀仍未見改善時請停止服用，並攜帶本說明書諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者**

## 療 效

- ◆ 頭痛、牙痛、拔牙後的疼痛、月經痛（生理痛）、神經痛、肌肉疼痛、腰痛、肩膀痠痛、關節痛、咽喉痛（喉嚨痛）、耳朵痛、撞傷痛、骨折痛、扭傷伴隨的疼痛（扭傷痛）、外傷痛的鎮痛
- ◆ 畏寒（發燒引起的身體寒冷）、發燒時的解熱



頭痛



生理痛





發燒



牙痛

## 用法及用量

以冷開水或溫水服用以下的量，並盡量避免於空腹時服用。  
每次服用請間隔 4 個小時以上。

年齡	1次量	服用次數
15歲以上	2錠 	1天最多3次
8歲~14歲	1錠 	
未滿 8 歲	不可服用	

### 【注意】

- (1) 請務必遵守規定用法、用量。
- (2) 若為兒童服用，請在家長的指導和監督下服用。
- (3) 錠劑取出方法

如圖所示，以指尖用力按壓裝有錠劑之 PTP 泡殼的凸出部位，使鋁箔背膜破裂後取出服用。

（不慎誤食包裝將可能造成刺傷食道黏膜等意外事故發生）

〈錠劑取出圖〉



## 成 分

2錠中

成 分	分 量	效 用
乙醯胺酚	265mg	發燒、頭痛、牙痛、生理痛等，鎮痛解熱。
鄰乙氧苯甲酰胺	300mg	透過鎮痛作用舒緩疼痛。
溴化羥草酸尿素	200mg	透過鎮靜作用，輔助乙醯胺酚等的鎮痛作用。
無水咖啡因	50mg	緩解頭痛。

添加物：纖維素、羧甲基纖維素鈣、羥丙基纖維素、硬脂酸鎂、硬化油

## 保管及使用上的注意事項

- (1) 請保管於濕度較低的陰涼處，避免日光直射。
- (2) 請保管於兒童無法觸及之處。
- (3) 請勿換裝至其他容器。（可能造成誤用或產品變質）
- (4) 請勿服用超過使用期限的產品。



## 請避免於空腹時服用

☆ 一般而言抑制發燒和疼痛的成分可能會刺激胃。  
請盡可能在服用前攝取食物或飲料。



### 【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。