

**ロキソプロフェンT液**  
**使用上の注意改訂のお知らせ**

本製品の使用上の注意を下記のとおり改訂いたします。

つきましては、改訂内容をご確認いただき、本製品の適正使用をお願い申し上げます。

記

<改訂内容>

改訂前		改訂後（___：改訂箇所）	
<p>「相談すること」            2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください            ・ ・ ・ ・ ・            まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</p>		<p>「相談すること」            2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください            ・ ・ ・ ・ ・            まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</p>	
症状の名称	症状	症状の名称	症状
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。	皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、 <u>多形紅斑</u>	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、 <u>水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる等</u> が持続したり、急激に悪化する。

以上