

医薬品を正しく購入するための  
**説 明 文 書**

指定第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	<b>ナロン顆粒</b>
2	成分・分量	1包(1.6g)中 アセトアミノフェン 265mg エテンザミド 300mg ブロモバレリル尿素 200mg 無水カフェイン 50mg
3	用法・用量	次の量をなるべく空腹時を避けて水又はぬるま湯で服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。 15才以上 1回1包、11才～14才 1回2/3包、 7才～10才 1回1/2包、3才～6才 1回1/3包、 1才～2才 1回1/4包、1日3回まで 1才未満 服用しないこと
4	効能・効果	◆頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・月経痛(生理痛)・神経痛・筋肉痛・腰痛・肩こり痛・関節痛・咽喉痛(のどの痛み)・耳痛・打撲痛・骨折痛・ねんざにともなう痛み(ねんざ痛)・外傷痛の鎮痛 ◆悪寒(発熱によるさむけ)・発熱時の解熱
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>次の人は服用しないでください (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。</li> <li>本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬</li> <li>服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります)</li> <li>服用前後は飲酒しないでください</li> <li>長期連用しないでください</li> <li>過量服用しないでください</li> <li>次に該当する人はお申し出ください <ul style="list-style-type: none"> <li>医師又は歯科医師の治療を受けている人。</li> <li>妊婦又は妊娠していると思われる人。</li> <li>水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15才未満)。</li> <li>高齢者。</li> <li>薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>次の診断を受けた人。 心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍</li> </ul> </li> </ol> <p>【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。