

◆NARON颗粒是受头痛、牙痛、月经痛等困扰的人群服用的止痛退烧药。通过acetaminophen、ethenzamide的止痛退烧作用、bromovalerylurea的镇静作用有效地减轻这些痛感。■本药剂为不含pyrine类药物的止痛退烧药。

## 效能或效果

1)头痛、牙痛、拔牙后疼痛、咽喉痛、耳痛、关节痛、神经痛、腰痛、肌肉痛、肩部酸痛、跌打痛、骨折疼痛、挫伤疼痛、月经痛(生理痛)、外伤疼痛的镇痛 2)恶寒及发烧时的解热

## 用法及用量

请尽量避免空腹时，按以下用量并配合水或温开水服用。但是，服用间隔时间为4小时以上。

15岁以上，1天不超过3次，1次1包  
11岁~14岁，1天不超过3次，1次2/3包  
7岁~10岁，1天不超过3次，1次1/2包  
3岁~6岁，1天不超过3次，1次1/3包  
1岁~2岁，1天不超过3次，1次1/4包  
未满3岁，不宜服用

请严格遵守规定的用法用量。

儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。

## 成分及分量

1包 (1.6 g) 中  
Acetaminophen 265mg  
Ethenzamide 300mg  
Bromvalerylurea 200mg  
Anhydrous caffeine 50mg

## 添加剂

Lactose ,Carboxymethylcellulose calcium ,Hydroxypropylcellulose,Potato starch,Magnesium aluminometasilicate ,l-Menthol

## 使用注意事项

### 禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故)

下述人群请不要服用

因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群

服用本药剂或其他解热镇痛药、感冒药后出现过哮喘的人群

●在服用本药剂期间，不要服用下述任何医药品

其他解热镇痛药、感冒药、镇静药、晕车药

●服用后不要驾驶交通工具或操作机械类(会出现嗜睡症状)

请不要在服用前后饮酒

●不要长期连续服用

### 咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师或牙科医师治疗的人群

孕妇或有其可能性的人群

患有水痘、流感或有其可能性的婴幼儿及儿童(未满15岁)

老年人

因药物等出现过过敏症状的人群

接受以下诊断的人群

心脏病

肾脏病

肝脏病

胃及十二指肠溃疡

●服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

皮肤：

起疹、发红

发痒

消化系统：

恶心

呕吐

食欲不振

精神神经系统：

头晕

其他：

体温过低

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

休克（过敏性）：服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。

史提芬强生症候群、中毒性表皮坏死松解症、急性泛发性发疹性脓疱病：高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹、发红、发红皮肤上出现小脓包、全身无力、没有食欲等症状持续或急剧恶化。

肝功能障碍：出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。

肾损伤：出现发烧、尿量减少、全身浮肿、全身无力、关节痛（各关节疼痛）、腹泻等症状。

间质性肺炎：上楼或因劳累而出现气短、气闷、空咳嗽、发烧，并且突然出现或长时间持续。

哮喘：呼吸时出现哮喘音、气闷等情况。

●服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

嗜睡

●若服用5~6次后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者

## 保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）

将1包分开服用时，折叠袋口进行保管，并在2天之内服用。

请勿服用超过使用期限的产品。

61

### 【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

·本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。

·多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。

·多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。

·关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任