*2026년 4월 개정
(사용 시 주의 사항 개정)

**복용 전에 이 설명서를 반드시 읽으십시오.
또한, 필요할 때 읽을 수 있도록 보관하십시오.**

아세트아미노펜
에텐자미드
배합

두통·발열에

NARON GRANULES

제2류 의약품

<해열 진통제>

◆**NARON GRANULES**는 두통·치통·생리통으로 고민하시는 분들을 위한 해열 진통제입니다. 아세트아미노펜·에텐자미드의 해열 진통 작용, 브롬발레릴 요소의 진정 작용으로 이러한 통증을 효과적으로 완화합니다.
◆본 약제는 피린계 약물이 함유되지 않은 해열 진통제입니다.

사용 시 주의 사항

금지 사항

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용·사고가 일어날 수 있습니다)

1 다음과 같은 사람은 복용하지 마십시오
(1) 본 약제 또는 본 약제의 성분으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.
(2) 본 약제 또는 다른 해열 진통제, 감기약을 복용하고 천식을 일으킨 적이 있는 사람.

2 본 약제를 복용하는 동안에는 다음 의약품을 복용하지 마십시오
다른 해열진통제, 감기약, 진정제, 멀미약

3 복용 후에는 차량 또는 기계류를 운전하지 마십시오
(졸음 증상이 나타날 수 있습니다)

4 복용 전후에는 음주하지 마십시오

5 장기간 연속해서 사용하지 마십시오

6 과다 복용하지 마십시오*

상담이 필요한 경우

1 다음과 같은 사람은 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오
(1) 의사 또는 치과의사의 치료를 받는 사람.
(2) 임부 또는 임신 중이라고 생각되는 사람.
(3) 수두 또는 인플루엔자에 걸렸거나 감염이 의심되는 영유아·어린이(15세 미만).
(4) 고령자.
(5) 약물 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.
(6) 다음 진단을 받은 사람.
심장 질환, 신장 질환, 간 질환, 위·십이지장 궤양

2 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우 부작용일 수 있으므로 즉시 복용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오

관련 부위	증상
피부	발진·발적, 가려움
소화기	메스꺼움·구토, 식욕 부진
정신신경계	현기증
기타	과도한 체온 저하

드물게 오른쪽에 기재된 위중한 증상이 나타날 수 있습니다. 이 경우 즉시 의사에게 진료를 받으십시오.

증상 명칭	증상
쇼크 (아나필락시스)	복용 후 바로 피부 가려움, 두드러기, 목 쉼, 재채기, 목구멍 가려움, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 증상이 발현한다.
피부 점막안 증후군(스티븐스존슨 증후군), 중독성 표피 괴사 용해증, 급성 범발성 발진성 농포증	고열, 눈 충혈, 눈곱, 입술 짓무름, 인후통, 피부의 광범위한 발진·발적, 빨개진 피부에 작고 도톨한 것(작은 농포)이 생김, 전신의 나른함, 식욕이 없는 증상 등이 지속되거나 급격히 악화된다.
약물 유발 과민증 증후군	넓은 부위에 피부가 붉어짐, 전신 발진, 발열, 몸이 나른함, 림프절(목, 겨드랑이,사타구니 등) 부종 등이 나타난다.
간 기능 장애	발열, 가려움, 발진, 황달(피부 및 눈흰자가 노랗게 변함), 갈색뇨, 전신 나른함, 식욕 부진 등의 증상이 나타난다.
신장 장애	발열, 발진, 소변량 감소, 전신 부종, 전신 나른함, 관절통(마디 통증), 설사 등이 나타난다.
간질성 폐렴	계단을 오르거나 조금 무리하면 호흡 곤란·숨이 참, 마른 기침, 발열 등을 보이며, 이들 증상이 갑자기 나타나거나 지속된다.
천식	숨을 쉴 때 색색, 휙휙과 같은 소리가 나며 답답함 등의 증상을 보인다.

3 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 지속되거나 심해질 경우 복용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오
졸림

4 5~6회 복용해도 증상이 나아지지 않는 경우에는 복용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 치과의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오

효능

◆ 두통·치통·발치 후 통증·월경통(생리통)·신경통·근육통·요통·어깨 결림 통증·관절통·인후통·귀 통증·타박통·골절통·염좌통·외상통의 진통
◆ 오한(발열로 인한 오한) 및 발열 시 해열

두통

발열

치통

용법·용량

다음 용량을 가급적 공복일 때를 피해 물 또는 미지근한 물과 함께 복용하십시오.
4시간 이상 간격을 두고 복용하십시오.

연령	15세 이상	11세~14세	7세~10세	3세~6세	1세~2세	1세 미만
1회 용량	1포	2/3포	1/2포	1/3포	1/4포	복용 금지
복용 횟수	1일 3회까지					

[주의]
(1) 정해진 용법·용량을 엄격하게 준수하십시오.
(2) 어린이가 복용하는 경우 보호자의 지도 감독 하에 복용해야 합니다.

성분

1포(1.6g) 중

성분	분량	효능
아세트아미노펜	265mg	발열·두통·치통·생리통 등 열과 통증을 완화합니다.
에텐자미드	300mg	진통 작용을 통해 통증을 가라앉혀 줍니다.
브롬발레릴 요소	200mg	진정 작용을 통해 아세트아미노펜의 진통 작용을 돕습니다.
무수 카페인	50mg	두통을 가라앉혀 줍니다.

첨가물: 유당, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 하이드록시프로필 셀룰로오스, 감자 전분, 마그네슘 알루미노메타실리케이트, l-멘톨

보관 및 취급 시 주의 사항

(1) 직사광선이 닿지 않는 서늘하고 습기가 적은 곳에 보관하십시오.
(2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
(3) 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. (오용의 원인이 되거나 품질 유지가 곤란할 수 있습니다)
(4) 1포를 분할한 나머지를 복용할 경우에는 봉지 입구를 접어 보관하고 2일 이내에 복용하십시오.
(5) 사용기한이 지난 제품은 복용하지 마십시오.

공복에는 복용하지 마십시오

☆ 일반적으로 열과 통증을 완화해주는 성분이 위를 자극할 수 있습니다.
복용하기 전에 가급적 음식이나 마실 것을 섭취하십시오.

【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.