

# NARON ACE T

지정제2류의약품  
해열 진통제

◆NARON ACE T는 2가지 종류의 해열 진통성분을 배합한 빨리 잘 듣는 해열 진통제입니다. ■통증의 근본을 차단하는 Ibuprofen에 통증의 이동을 차단하는 Ethenzamide의 조합에 의한 상승적인 진통 작용이 고통스러운 통증에 효과를 발휘합니다. ■정제를 소형화함에 따라 더 복용하기 쉬워졌습니다.

## 효능 또는 효과

1) 두통·치통·발치 후 동통·인후통·이통·관절통·신경통·요통·근육통·어깨 결림통·타박통·골절통·염좌통·월경통(생리통)·외상 통의 진통 □

## 용법 및 용량

다음의 양을 가급적 공복 시를 피하여 찬물 또는 미지근한 물과 함께 복용하십시오. 복용 간격은 4시간 이상 두십시오.

15세 이상, 1회 2정, 1일 3회까지

15세 미만, 복용하지 말 것

정해진 용법·용량을 엄수해 주십시오.

정제 꺼내는 법

·그림과 같이 정제가 들어 있는 PTP 시트의 철부를 손가락 끝으로 강하게 눌러 뒷면의 알루미늄 포일을 뚫은 후, 정제를 꺼내어 복용하십시오.

·(잘못하여 시트를 그대로 삼키면 식도 점막에 끼히는 등 불의의 사고로 이어질 수 있습니다.)

## 성분 및 분량

In 2 tablets

Ibuprofen 144mg

Ethenzamide 84mg

Bromvalerylurea 200mg

Anhydrous caffeine 50mg

## 첨가물

anhydrous silicic acid ,Hydroxypropylcellulose,Hypromellose,Croscarmellose sodium,Talc,Magnesium stearate,Lactose ,Sunset Yellow FCF ,cellulose

## 사용상의 주의

### 해서는 안 되는 것

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용·사고가 일어나기 쉽다)

다음에 해당하는 사람은 복용하지 마십시오.

본제 또는 본제의 성분에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.

본제 또는 다른 해열진통제, 감기약을 복용 후 천식을 일으킨 적이 있는 사람

15세 미만의 소아

출산예정일 12주 이내의 임산부

본제를 복용하는 동안은 다음의 어떤 의약품도 사용하지 마십시오.

다른 해열 진통제, 감기약, 진정제, 멀미약

●복용 후 차량 또는 기계류의 운전 조작을 하지 않을 것(졸음 등이 나타날 수 있다.)

복용 전후는 음주하지 마십시오.

●장기간 연용하지 않을 것

## 상담할 내용

●다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.

임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람.

수유 중인 사람.

고령자.

약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.

다음의 진단을 받은 사람.

심장병

신장병

간장병

전신성 홍반성 낭창

혼합성 결합 조직 질환

다음 병에 걸린 적이 있는 사람.

위·십이지장 궤양

궤양성 대장염

크론병

●복용 후 다음 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

피부: 발진·발적, 가려움, 푸른 멍이 생긴다

소화기: 메스꺼움·구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 위통, 구내염, 속쓰림, 위 답답함, 위장 출혈, 복통, 설사, 혈변

정신신경계:

현기증

순환기: 두근거림

호흡기:

숨이 참

기타: 눈 침침함, 이명, 부음, 코피, 잇몸 출혈, 출혈이 멈추지 않는다, 출혈, 등 통증, 과도한 체온 저하, 나른함 드물게 다음과 같은 심각한 증상이 일어날 수 있습니다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

쇼크(아나필락시스): 복용 후 즉시 피부 가려움증, 두드러기, 목쉼소리, 재채기, 인후 가려움증, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타난다.

피부 점막안 증후군(스티븐스-존슨 증후군), 중독성 표피 괴사 용해증: 고열, 눈의 충혈, 눈곱, 입술 진무름, 인후 통증, 피부의 광범위한 발진·발적 등이 지속되거나 급격히 악화된다.

신장 장애: 발열, 발진, 소변량 감소, 전신 부종, 전신의 나른함, 관절통(마디마디가 아픈 증상), 설사 등이 나타난다.

간 기능 장애: 발열, 가려움증, 발진, 황달 (피부와 눈 흰자위가 노랗게 되는 증상), 갈색뇨, 전신의 나른함, 식욕 부진 등이 나타난다.

무균성 뇌막염: 목덜미가 당기는 심한 두통, 발열, 메스꺼움·구토 등이 나타난다. (이러한 증상은 특히 전신성 홍반성 낭창 또는 혼합성 결합 조직 질환의 치료를 받고 있는 사람에게서 많이 보고되고 있다.)

천식: 숨을 쉴 때 색색, 휘휘과 같은 소리가 나며, 답답함 등의 증상을 보인다.

재생 불량성 빈혈: 푸른 멍, 코피, 잇몸 출혈, 발열, 피부와 점막이 창백해 보임, 피로감, 두근거림, 숨이 참, 속이 안 좋아지며 어질해짐, 혈뇨 등이 나타난다.

무과립구증: 갑작스런 고열, 오한, 인후통 등이 나타난다.

●복용 후 다음 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상의 지속 또는 증강을 보인 경우에는 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것.

변비, 졸음

●5~6회 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 치과의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

## 보관 및 취급상의 주의

직사광선이 닿지 않는 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)

사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

11

### 【OTC 의약품의 다언어 제품 정보에 관한 면책사항】

·본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.

·다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.

·다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가변역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.

·다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다..