

ナロンエースR

指定第二類医薬品
解熱鎮痛薬

◆ナロンエースRは、痛みのメカニズムを解析し、5つの成分を配合した、つらい頭痛に速く効く解熱鎮痛薬です。■2種類の解熱鎮痛成分（イブプロフェン、エтенザミド）の働きをプロモバレリル尿素、無水カフェインが助け、痛み・熱に効果を発揮します。■また乾燥水酸化アルミニウムゲルが胃粘膜を保護し、胃の荒れを防ぎます。■服用しやすい小型の錠剤です。

効能・効果

- 1)頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛□
- 2)悪寒・発熱時の解熱

用法・用量

次の量をなるべく空腹時を避けて水又はぬるま湯で服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

1 5歳以上、1回2錠、1日3回まで

1 5才未満、服用しないこと

定められた用法・用量を厳守してください。

錠剤の取り出し方

・図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。

・（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）

成分及び分量

2錠中

イブプロフェン 144mg

エтенザミド 84mg

プロモバレリル尿素 200mg

無水カフェイン 50mg

乾燥水酸化アルミニウムゲル 66.7mg

添加物

無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、ヒプロメロース、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、乳糖、青色1号、タルク

使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

次の人服用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人

15才未満の小児

出産予定期12週以内の妊娠

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

●服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと（眠気等があらわれることがある。）

服用前後は飲酒しないでください

●長期連用しないこと

相談すること

●次の人服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

医師又は歯科医師の治療を受けている人。

妊婦又は妊娠していると思われる人。

授乳中の人の

高齢者。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

次の診断を受けた人。

心臓病

腎臓病

肝臓病

全身性エリテマトーデス

混合性結合組織病

次の病気にかかったことのある人。

胃・十二指腸潰瘍

潰瘍性大腸炎

クローン病

●服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

皮膚：発疹・発赤、かゆみ、青あざができる

消化器：吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、胃痛、口内炎、胸やけ、胃もたれ、胃腸出血、腹痛、下痢、血便

精神神経系：

めまい

循環器：動悸

呼吸器：

息切れ

その他：目のかすみ、耳なり、むくみ、鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、背中の痛み、過度の体温低下、からだがだるい
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

ショック（アナフィラキシー）：服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症：高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。

腎障害：発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。

肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

無菌性髄膜炎：首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気・嘔吐等があらわれる。（このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。）

ぜんそく：息をするときゼーザー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

再生不良性貧血：青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつと/orする、血尿等があらわれる。

無顆粒球症：突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

●服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

便秘、眠気

●5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

小児の手のとどかない所に保管してください。

他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)

使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

21

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。