

◆Naron Ace R基於分析疼痛機制，搭配5大成分，為針對惱人頭痛迅速作用的解熱鎮痛藥。■Bromovalerylurea、無水咖啡因幫助2種解熱鎮痛成分（ibuprofen、ethenzamide）作用，對疼痛、發燒發揮效果。■此外，dried aluminum hydroxide gel成分保護胃壁黏膜，預防胃部受損。■易於服用的小型錠劑。

## 療效或效果

1)頭痛、牙痛、拔牙後的疼痛、咽喉痛、耳朵痛、關節痛、神經痛、腰痛、肌肉疼痛、肩膀痠痛、撞傷痛、骨折痛、扭傷痛、月經痛(生理痛)、外傷痛的鎮痛2)惡寒、發燒時的解熱

## 用法及用量

請用冷水或微溫水服用以下用量，並盡量避免於空腹時服用。請每隔4小時以上服用。

15歲以上，1天最多3次，1次2片

未滿15歲者，請勿服用

請務必遵守規定用法、用量。

錠劑取出方法

●如圖所示，以指尖用力按壓藥錠PTP包裝凸出部位，使鋁箔背模破裂後取出藥錠服用。

●（不慎誤食包裝將可能造成刺傷食道黏膜等意外事故發生）

## 成分及分量

2片中

Ibuprofen 144mg

Ethenzamide 84mg

Bromvalerylurea 200mg

Anhydrous caffeine 50mg

Dried aluminum hydroxide gel 66.7mg

## 添加劑

anhydrous silicic acid ,Hydroxypropylcellulose,cellulose,Hypromellose,Croscarmellose sodium,Magnesium stearate,Lactose ,Brilliant blue,Talc

## 使用上的注意事項

### 禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外）

符合下列情形者請勿服用

曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。

曾因服用本藥劑或其他解熱鎮痛藥、感冒藥而引起氣喘者

未滿15歲的兒童

預產期12週以內的孕婦

服用本藥劑期間，請勿使用下列任何一種醫藥品。

其他解熱鎮痛藥、感冒藥、鎮靜藥、暈車藥

●服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類（可能出現嗜睡等。）

服用前後請勿飲酒

●請勿長期連續服用

### 諮詢事項

●下列的人於服用前，請諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師或牙科醫師治療的人。

孕婦或可能懷孕的人。

正在哺乳的人。

年長者。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

接受過下列診斷的人。

心臟病

腎臟病

肝臟病

全身性紅斑性狼瘡

混合性結締組織病

曾罹患下列疾病的人。

胃潰瘍、十二指腸潰瘍

潰瘍性大腸炎

克隆氏症

●服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：出疹、發紅、搔癢、出現瘀青

消化器官：噁心、嘔吐、食慾不振、胃部不適、胃痛、口腔炎、胸口灼熱、胃脹、腸胃出血、腹痛、腹瀉、血便

精神神經系統：

頭暈

循環器官：心悸

呼吸器官：

氣短

其他：視力模糊、耳鳴、浮腫、鼻血、牙齦出血、不易止血、出血、背痛、體溫過低、倦怠感

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立即接受醫師診治。

休克（過敏性）：服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。

史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死鬆解症：發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹・發紅等持續，或者突然惡化。

腎功能障礙：出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛（各關節疼痛）、腹瀉等。

肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食慾不振等。

無菌性腦膜炎：出現伴隨脖子抽筋的劇烈頭痛、發燒、噁心・嘔吐等。（尤其是接受全身性紅斑性狼瘡或混合性結締組織病治療的人當中，許多人自訴這種症狀。）

氣喘：呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。

再生不良性貧血：出現瘀青、流鼻血、牙齦出血、發燒、皮膚和黏膜看起來蒼白、疲勞感、心悸、氣短、身體不適、暈眩、血尿等。

無顆粒性白血球症：出現突然發高燒、發冷、喉嚨痛等。

●服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者  
便秘、嗜睡

●即使服用5~6次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

## 保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

請勿服用超過使用期限的產品。

21

### 【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- ・本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- ・多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- ・多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- ・关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。