

ナロンL o x y
使用上の注意改訂のお知らせ

本製品の使用上の注意を下記のとおり改訂いたします。

つきましては、改訂内容をご確認いただき、本製品の適正使用をお願い申し上げます。

記

<改訂内容>

改訂前	改訂後（___：改訂箇所）								
<p>「相談すること」 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください ・ ・ ・ ・ ・ まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">症状の名称</th> <th style="text-align: center;">症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症</td> <td>高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。</td> </tr> </tbody> </table>	症状の名称	症状	皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。	<p>「相談すること」 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください ・ ・ ・ ・ ・ まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">症状の名称</th> <th style="text-align: center;">症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、多形紅斑</td> <td>高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、<u>水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる等</u>が持続したり、急激に悪化する。</td> </tr> </tbody> </table>	症状の名称	症状	皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、多形紅斑	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、 <u>水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる等</u> が持続したり、急激に悪化する。
症状の名称	症状								
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。								
症状の名称	症状								
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、多形紅斑	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、 <u>水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる等</u> が持続したり、急激に悪化する。								

以上