

ナロンL o x y
使用上の注意改訂のお知らせ

本製品の使用上の注意を下記のとおり改訂いたします。

つきましては、改訂内容をご確認いただき、本製品の適正使用をお願い申し上げます。

記

<改訂内容>

| 改訂前 | | 改訂後（___：改訂箇所） | |
|--|---|--|--|
| <p>「相談すること」 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください ・ ・ ・ ・ ・ まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</p> | | <p>「相談すること」 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください ・ ・ ・ ・ ・ まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</p> | |
| 症状の名称 | 症状 | 症状の名称 | 症状 |
| 皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、多形紅斑 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる等が持続したり、急激に悪化する。 | 皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、多形紅斑、 <u>急性汎発性発疹性膿疱症</u> | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる、 <u>赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等</u> が持続したり、急激に悪化する。 |

以上