

◆NARON MEDICAL是1天最多可以服用600mgibuprofen（迅速抑制引发痛感的物质前列腺素的产生）的止痛退烧药，对于15种的疼痛有快速且显著的改善效果。●此药剂为脱咖啡因的，易饮用的小颗粒药片。

## 效能或效果

1)头痛、牙痛、拔牙后疼痛、咽喉痛、耳痛、关节痛、神经痛、腰痛、肌肉痛、肩部酸痛、跌打痛、骨折疼痛、挫伤疼痛、月经痛(生理痛)、外伤疼痛的镇痛②恶寒及发烧时的解热

## 用法及用量

在出现了症状的时候，请尽量避免空腹时，按以下用量并配合水或温开水服用：

成年人（15岁以上） 1天不超过2次，1次2片

\* 但是，如果再次出现症状时可以第3次服用。

服用间隔请隔开4个小时以上

未满15岁，不宜服用

请严格遵守规定的用法用量。

药片的取用方法

·如图所示用指尖用力按下装有药片的PTP板的凸出部，弄破背面的铝箔再取出服用。

·（以包装的状态直接误吞，会发生穿破食管粘膜等意外事故）

## 成分及分量

2片中

Ibuprofen 200mg

## 添加剂

Hydroxypropylcellulose,anhydrous silicic acid ,cellulose,Hypromellose,Talc,Magnesium stearate,Polyvinyl alcohol(Partially saponified),Titanium oxide,Paraffin,Carnauba wax ,sucrose fatty acid ester ,Polysorbate 80

## 使用注意事项

### 禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故）

下述人群请不要服用

因为本药剂或本药剂的成分引起过过敏症状（例如，起疹发红、发痒等）的人群。

服用本药剂或其他解热镇痛药、感冒药后出现过哮喘的人群

（有可能会引发哮喘）

未满15岁的儿童

在医疗机构接受下述疾病的治疗或服用药物的人群

胃及十二指肠溃疡

血液疾病

肝脏病

肾脏病

心脏病

高血压

正在服用zidovudine（Retrovir等）的人群

（患有胃十二指肠溃疡、肝脏病、肾脏病的人群，可能会使症状加重）

（患有血液疾病的人群可能因为引起白血球减少、血小板减少等，使症状更加加重）

（患有心脏病的人群，可能会使心功能不全症状更加加重）

（患有高血压的人群，可能会使血压更加升高）

预产期在12周以内的孕妇

●在服用本药剂期间，不要服用下述任何医药品

其他解热镇痛药、感冒药、镇静药

请不要在服用前后饮酒

（一般情况下，酒精会促进药物的吸收以及代谢，因此可能会使副作用或毒性加强而出现严重的肝功能障碍）

●不要长期连续服用

### 咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医生或牙科医生治疗的人群或正在服用以下药物的人群

Coumarin类抗凝血剂（warfarin）、aspirin药剂（作为抗血小板剂服用的情况）、lithium药剂（lithium carbonate）、thiazide利尿药（hydrochlorothiazide）、髓袢利尿药（furosemide）、tacrolimus hydrate、new quinolone类抗菌药（enoxacin hydrate等）、methotrexate、colestyramine

孕妇或有其可能性的人群

哺乳期人群

老年人

一般老年人因为生理功能正在减退，因此容易出现副作用

因药物等出现过敏症状的人群

接受下述诊断的人群或患过这些疾病的人群

胃及十二指肠溃疡

血液疾病

肝脏病

肾脏病

心脏病

高血压

支气管哮喘

(可能会引发支气管哮喘)，

全身性红斑狼疮

可能会使肾功能障碍等疾病的症状加重，或出现无菌性脑膜炎

混合结缔组织病

可能会出现无菌性脑膜炎

溃疡性大肠炎

克隆氏症

有报告称曾发生过症状恶化

●服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

皮肤：

起疹、发红

发痒

消化系统：

恶心

呕吐

食欲不振

胃痛

胃部不适

烧心

腹痛

口腔溃疡

精神神经系统：

头晕

嗜睡

失眠

郁闷

其他：

视线模糊

耳鸣

心悸

浮肿

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

休克（过敏性）：服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。

血液障碍：出现下述症状：易出现淤青、突发高烧、发冷、咽喉疼痛、易出血（牙龈出血、鼻血等）、止血困难等

消化系统障碍：出现大便发黑、吐血、血便、粘液血便（血液、粘液、脓混合的软便）等症状

史提芬强生症候群、中毒性表皮坏死松解症：高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹、发红等症状持续或急剧恶化。

肾损伤：出现发烧、尿量减少、全身浮肿、全身无力、关节痛（各关节疼痛）、腹泻等症状。

无菌性脑膜炎：因颈部抽筋出现剧烈头痛、发烧、恶心及呕吐等症状。（尤其在接受全身性红斑狼疮或混合结缔组织病治疗的人群中多有该症状的报告案例。）

肝功能障碍：出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。

哮喘：呼吸时出现哮喘音、气闷等情况。

服用后，有可能会出现体温比平时降低、无力（虚脱）、手脚发冷（四肢冰冷）等症状。出现这样的情况，请立即停止服用，用毛毯等进行保温，并咨询医生、药剂师或登录贩卖者

●服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

腹泻、便秘、口腔干燥

即使服用3~4次仍不见症状好转时，请停止服用，并携带本说明书咨询医生、牙科医生、药剂师或登录贩卖者

## 保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）

请勿服用超过使用期限的产品。

**【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】**

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任