

◆ASCLON是含有使支气管张开让呼吸变得通畅而缓解咳嗽症状的methoxyphenamine hydrochloride在内的6种有效成分的颗粒型镇咳祛痰药。■有效地改善带喘息的严重的咳嗽、感冒等引起的咳嗽以及痰。

效能或效果

1)咳嗽、伴随喘鸣（嗤嗤、呼呼）的咳嗽、痰

用法及用量

请按以下用量并配合水或温开水服用：

15岁以上，1天3次，1次1包

8岁~14岁，1天3次，1次1/2包

未满8岁，不宜服用

请严格遵守规定的用法用量。

儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。

成分及分量

1包（1g）中

Methoxyphenamine hydrochloride 50mg

Noscapine 20mg

Crude Glycyrrhiza Extract 66mg (equivalent to 330 mg of the crude drug)

Potassium Guaiacolsulfonate 90mg

Anhydrous caffeine 50mg

Carbinoxamine maleate 4mg

添加剂

Magnesium aluminometasilicate ,cellulose,Lactose ,Hydroxypropylcellulose,flavor

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故）

在服用本药剂期间，不要服用下述任何药物。

其他镇咳祛痰药、感冒药、镇静药、含抗组胺剂的内服药等（鼻炎用内服药、晕车药、抗过敏药等）

●服用后不要驾驶交通工具或操作机械类（会出现嗜睡症状）

咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师治疗的人群

孕妇或有其可能性的人群

老年人

因药物等出现过过敏症状的人群

拥有以下症状的人群

高烧

排尿困难

接受以下诊断的人群

心脏病

高血压

糖尿病

青光眼

甲状腺功能障碍

●服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

皮肤：

起疹、发红

发痒

消化系统：

恶心

呕吐

食欲不振

精神神经系统：

头晕

泌尿系统：

排尿困难

●服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

嗜睡

口腔干燥

●若服用5~6次后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）

将1包分开服用时，折叠袋口进行保管，并在2天之内服用。

请勿服用超过使用期限的产品。

81

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

·本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。

·多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。

·多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。

·关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任