

◆ASCLON含有具擴張支氣管、順暢呼吸、止咳作用的methoxyphenamine hydrochloride等6種有效成分，細微顆粒的鎮咳祛痰藥。●有效改善伴隨喘鳴聲的惱人咳嗽、感冒等所造成的咳嗽及痰涎。

療效或效果

1)咳嗽、伴隨喘鳴聲（呼呼聲、咻咻聲）的咳嗽、生痰

用法及用量

請於餐後用冷水或微溫水服用以下用量：

15歲以上，1天3次，1次1包

8歲～14歲，1天3次，1次1／2包

未滿8歲者，請勿服用

請務必遵守規定用法、用量。

兒童服用時，請於家長的指導監督下使用。

成分及分量

1包（1g）中

Methoxyphenamine hydrochloride 50mg

Noscapine 20mg

Crude Glycyrrhiza Extract 66mg（equivalent to 330 mg of the crude drug）

Potassium Guaiacolsulfonate 90mg

Anhydrous caffeine 50mg

Carbinoxamine maleate 4mg

添加劑

Magnesium aluminometasilicate ,cellulose,Lactose ,Hydroxypropylcellulose,flavor

使用上的注意事項

禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外）

服用本藥劑期間，請勿使用下列任何一種醫藥品。

其他鎮咳祛痰藥、感冒藥、鎮靜藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏用藥等）

●服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類（可能出現嗜睡等。）

諮詢事項

●下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

孕婦或可能懷孕的人。

年長者。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

有下列症狀的人。

發高燒

排尿困難

接受過下列診斷的人。

心臟病

高血壓

糖尿病

青光眼

甲狀腺功能障礙

●服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：

發疹、發紅

發癢

消化器官：

噁心

嘔吐

食欲不振

精神神經系統：

頭暈

泌尿器官：

排尿困難

●服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
嗜睡

口乾

●即使服用5~6次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。(可能造成誤用或產品變質)

單包分次服用時，請將袋口反折保管並於2天內服用完畢。

請勿服用超過使用期限的產品。

81

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。