

アニマリンL錠

◆アミノ酸は三大栄養素のひとつで、体を構成するタンパク質のもととなる重要な栄養素です。■その中で、体内では合成できないアミノ酸を必須アミノ酸と言います。●アニマリンL錠は、必須アミノ酸にビタミンB群・Eを配合した保健薬です。

効能・効果

大人（15才以上）

肉体疲労・病中病後・栄養障害・発熱性消耗性疾患

胃腸障害

妊娠授乳期などの場合の栄養補給

滋養強壮

虚弱体質

小児（7～14才）

☆小児の発育期・偏食児・発熱性消耗性疾患・病中病後・胃腸障害・栄養障害などの場合の栄養補給

滋養強壮

虚弱体質

用法・用量

次の量を水又はぬるま湯で服用してください

大人（15才以上）、1回2錠、1日1～2回

小児（7～14才）、1回1錠、1日1～2回

7才未満、服用しないこと

定められた用法・用量を厳守してください。

小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

ぬれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないでください。（変色等の原因となり、品質が変わることがあります）

成分及び分量

2錠中

L-イソロイシン 30mg

L-ロイシン 34mg

L-リジン塩酸塩 37.5mg

L-フェニルアラニン 20mg

L-メチオニン 30mg

L-トレオニン 20mg

L-トリプトファン 10mg

L-バリン 30mg

L-アルギニン塩酸塩 20mg

チアミン硝化物 10mg

リボフラビン 4mg

ピリドキシン塩酸塩 15mg

トコフェロールコハク酸エステルカルシウム 5mg

ニコチン酸アミド 30mg

添加物

トウモロコシデンプン、セルロース、カルメロースカルシウム(CMC-Ca)、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、硬化油、白糖、ヒプロメロース、プロピレングリコール、酢酸セルロース、炭酸カルシウム、タルク、ゼラチン、アラビアゴム、無水ケイ酸、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、酸化チタン、カルナウバロウ

成分及び分量に関連する注意

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミンB2によるもので、ご心配ありません

使用上の注意

相談すること

●服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

皮膚：

発疹

消化器：

胃部不快感

●服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

●しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない（湿気の少ない）涼しい所に（密栓して）保管すること。
小児の手のとどかない所に保管してください。
他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
なお、使用期限内であっても、開封後は6か月以内に使用してください。（品質保持のため）

32

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。