

ANIMALIN A

◆아미노산 · 황정 · 구기자

효능

- ★육체 피로 · 병중 및 병후 · 식욕 부진 · 영양 장애 · 발열성 소모성 질환 · 임신 수유기 등의 경우의 영양공급
- ★자양강장
- ★허약 체질

용법 및 용량

성인 (15 세 이상) 1 일 1 회 1 병 (50mL) 을 복용하십시오.

※15 세 미만은 복용하지 마십시오.

주의

- 정해진 용법 · 용량을 엄수해 주십시오. (다른 비타민 등을 함유하는 제품을 동시에 복용하는 경우에는 과잉 섭취 등에 주의하십시오)
- 본제는 생약 성분을 포함하므로 드물게 침전물이 생길 수 있지만, 약효는 변함 없습니다. 잘 흔들어서 복용하십시오.

성분

1 병 (50mL) 중

타우린 1000mg

L-발린 80mg

L-이소류신 100mg

L-류신 240mg

L-아르기닌 염산염 300mg

티아민 질산염 (비타민 B₁) 5mg

리보플라빈 인산 에스테르 나트륨 (비타민 B₂) 5mg

피리독신 염산염 (비타민 B₆) 10mg

무수카페인 50mg

황정 유동 추출물 0.24mL (황정 240mg 에 해당)

구기자 유동 추출물 0.2mL (구기자 200mg 에 해당)

첨가물

전화형 액당 (포도당, 과당, 백당), DL-말산, 안식향산 나트륨, 시트르산 수화물, 향료, 알코올, 에틸 바닐린, 바닐린, 프로펠렌글리콜 (0.2mL 이하)

주의

본제의 복용으로 인해 소변 색깔이 노래지는 경우가 있으나, 이는 약에 포함되어 있는 비타민 B₂가 흡수됨에 따른 것으로 걱정하실 필요 없습니다.

사용상의 주의

상담할 내용

- 복용 후, 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 제품을 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오
피부: 발진
소화기: 위부 불쾌감
- 복용 후, 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 지속 또는 증강을 보인 경우에는 복용을 중단한 후, 이 제품을 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오
설사
- 한동안 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후, 이 제품을 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

보관 및 취급상의 주의

- 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.