

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	アパロン
2	成分・分量	1包(1.3g)中 炭酸水素ナトリウム 200mg ケイ酸アルミン酸マグネシウム 300mg ロートエキス 3倍散 30mg(ロートエキスとして10mg) ソファルコン 100mg
3	用法・用量	次の量を1日3回、食間又は就寝前に水又はぬるま湯で服用してください。 15才以上 1回1包 15才未満 服用しないこと
4	効能・効果	胸やけ、胃痛、胃部不快感、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気)、 飲みすぎ、胃酸過多、胃部膨満感、胃もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、嘔吐
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> 次の人は服用しないでください 透析療法を受けている人。 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 胃腸鎮痛鎮痙薬(胃や腸の痛みをおさえる薬) 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください (母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります) 長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください <ul style="list-style-type: none"> 医師の治療を受けている人。 妊婦又は妊娠していると思われる人。 高齢者。 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 次の症状のある人。 排尿困難 次の診断を受けた人。 腎臓病、心臓病、緑内障 他の薬剤を服用している人。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。