

大正下痢止め〈小児用〉

◆大正下痢止め〈小児用〉は、不快な下痢症状を改善するとともに、下痢によって消耗しがちなビタミンB1・B2を補給します。■小さなお子さまにも服用させやすいバナナ風味のお薬です。

効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

用法・用量

次の量を1日3回を限度とし、水又はぬるま湯で服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

5～7才、1回1包、1日3回まで

3～4才、1回2／3包、1日3回まで

1～2才、1回1／2包、1日3回まで

3ヵ月以上1才未満、1回1／4包、1日3回まで

3ヵ月未満未満、服用しないこと

定められた用法・用量を厳守してください。

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させること。

成分及び分量

1包（1.2g）中

タンニン酸ベルベリン 30mg

タンニン酸アルブミン 440mg

ピオチアスターゼ2000 30mg

チアミン硝化物 2mg

リボフラビン 1mg

添加物

バレイシデンブ、白糖、トウモロコシデンブ、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、香料、ゼラチン、ソルビタン脂肪酸エステル

成分及び分量に関連する注意

本剤の服用により、尿が黄色になることがあります。これは本剤中のビタミンB2によるもので、ご心配ありません

使用上の注意

してはいけないこと

本剤は小児用ですが、下痢止め薬として定められた一般的な注意事項を記載しています（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

●次の人は服用しないこと

本剤又は本剤の成分、牛乳によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

相談すること

●次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

医師の治療を受けている人。

発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。

急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。（本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがある。）

高齢者。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

●服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

皮膚：

発疹・発赤

かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

ショック（アナフィラキシー）：服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。

5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

小児の手のとどかない所に保管してください。

他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）

1包を分割した残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。