

◆浑身无力、肩膀发硬、腰部疼痛、手脚发麻等，这些是随着年龄增长经常出现的症状。■Samon Ace药剂以中药浓缩液为主要成分，再加上配制人参精华、维生素E制作而成，对于随着年龄增长出现的这些症状有效。

效能或效果

中年期以后出现的下述各种症状：倦怠感、肩周炎、腰痛、口干、手脚发凉发麻、尿频

用法及用量

大人1天3次，1次粒胶囊，请配合水或温开水服用。

请严格遵守规定的用法用量。

·胶囊的取用方法

·用指尖用力按下装有胶囊的PTP板的凸出部，弄破背面的铝箔再取出服用。（以包装的状态直接误吞，会发生穿破食管粘膜等意外事故）

成分及分量

3粒胶囊中

Chibakujiogan dry extract 866mg (equivalent to 2000mg of Rehmannia root, 1000mg of Dioscorea rhizome, 1000mg of Cornus fruit, 1000mg of Moutan bark, 1000mg of Alisma rhizome, 1000mg of Poria sclerotium, 1000mg of Anemarrhena rhizome, 666mg of Phellodend

Ginseng extract 70mg (equivalent to 1000 mg of the crude drug)

Tocopherol Calcium Succinate 10mg

添加剂

Aluminum hydroxide/magnesium hydroxide, cellulose, Magnesium stearate, Brilliant blue, Erythrosine, Sunset Yellow FCF, Sodium lauryl sulfate, Gelatin

使用注意事项

咨询事项

●服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

消化系统：

食欲不振

●服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

软便

●若服用一段时间后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）

请勿服用超过使用期限的产品。

此外，即使在使用期限内，开封后请在6个月以内使用。（为了保证质量）

12

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

·本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。

·多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。

·多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。

·关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任