

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	<b>大正トンプク</b>
2	成分・分量	1包(1.2g)中 アセトアミノフェン 300mg エテンザミド 350mg ブロモバレリル尿素 200mg 無水カフェイン 50mg
3	用法・用量	次の量をなるべく空腹時を避けて水又はぬるま湯で服用してください。服用間隔は6時間以上おいてください。 15歳以上 1回1包、11歳～14歳 1回2/3包、8歳～10歳 1回1/2包、5歳～7歳 1回1/3包、3歳～4歳 1回1/4包、1日2回まで。 3歳未満 服用しないこと
4	効能・効果	◆歯痛・抜歯後の疼痛・頭痛・咽喉痛(のどの痛み)・腰痛・肩こり痛・筋肉痛・関節痛・神経痛・月経痛(生理痛)・耳痛・打撲痛・骨折痛・ねんざにともなう痛み(ねんざ痛)・外傷痛の鎮痛 ◆悪寒(発熱によるさむけ)・発熱時の解熱
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります) 4. 服用前後は飲酒しないでください 5. <u>長期連用しないでください</u> 6. 次に該当する人はお申し出ください ・医師又は歯科医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満) ・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の診断を受けた人。 心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍  【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。