

◆TAISHO TONPUKU는 해열 진통 작용이 있는 Acetaminophen, Ethenzamide, 진정 작용이 있는 Bromovalerylurea를 배합한 미립으로 참을 수 없는 치통, 두통을 진정시킵니다.

## 효능 또는 효과

- 1) 두통·치통·발치 후 동통·인후통·이통·관절통·신경통·요통·근육통·어깨 결림통·타박통·골절통·염좌통·월경통(생리통)·외상 통의 진통 □
- 2) 오한·발열 시의 해열

## 용법 및 용량

다음의 양을 가급적 공복 시를 피하여 찬물 또는 미지근한 물과 함께 복용하십시오. 복용 간격은 6시간 이상 두십시오.

- 15세 이상, 1회 1포, 1일 2회까지
  - 11세~14세, 1회 2/3포, 1일 2회까지
  - 8세~10세, 1회 1/2포, 1일 2회까지
  - 5세~7세, 1회, 1/3포, 1일 2회까지
  - 3세 미만, 복용하지 말 것
- 정해진 용법·용량을 엄수해 주십시오.  
소아에게 복용하게 할 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용하도록 하십시오.

## 성분 및 분량

In 1 packet (1.2 g)  
Acetaminophen 300mg  
Ethenzamide 350mg  
Bromvalerylurea 200mg  
Anhydrous caffeine 50mg

## 첨가물

cellulose, Lactose, Magnesium aluminometasilicate, Hydroxypropylcellulose, l-Menthol

## 사용상의 주의

### 해서는 안 되는 것

- (지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용·사고가 일어나기 쉽다)  
다음에 해당하는 사람은 복용하지 마십시오.  
본제 또는 본제의 성분에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.  
본제 또는 다른 해열진통제, 감기약을 복용 후 천식을 일으킨 적이 있는 사람  
●이 약을 복용하는 동안은 다음 중 어떤 의약품도 복용하지 않을 것  
다른 해열 진통제, 감기약, 진정제, 멀미약  
●복용 후 차량 또는 기계류의 운전 조작을 하지 않을 것(졸음 등이 나타날 수 있다.)  
복용 전후는 음주하지 마십시오.  
●장기간 연용하지 않을 것

### 상담할 내용

- 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 치과의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것  
의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.  
임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람.  
수두 또는 독감에 걸린 상태이거나 걸렸다고 의심이 되는 영아, 유아, 소아(15세 미만).  
고령자.  
약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.  
다음의 진단을 받은 사람.  
심장병  
신장병  
간장병  
위·십이지장 궤양  
●복용 후 다음 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것  
피부:  
발진·발적  
가려움  
소화기:  
메스꺼움  
구토  
식욕 부진  
정신신경계:

현기증

기타:

과도한 체온 저하

드물게 다음과 같은 심각한 증상이 일어날 수 있습니다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

쇼크(아나필락시스): 복용 후 즉시 피부 가려움증, 두드러기, 목쉼소리, 재채기, 인후 가려움증, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타납니다.

피부 점막안 증후군(스티븐스-존슨 증후군), 중독성 표피 괴사 용해증, 급성 범발성 발진성 농포증: 고열, 눈 충혈, 눈곱, 입술 진무름, 인후 통증, 피부의 광범위한 발진·발적, 빨개진 피부에 작고 도돌한 것(작은 농포)이 생김, 전신의 나른함, 식욕이 없는 증상 등이 지속되거나 급격히 악화된다.

간 기능 장애: 발열, 가려움증, 발진, 황달 (피부와 눈 흰자위가 노랗게 되는 증상), 갈색뇨, 전신의 나른함, 식욕 부진 등이 나타납니다.

신장 장애: 발열, 발진, 소변량 감소, 전신 부종, 전신의 나른함, 관절통(마디마디가 아픈 증상), 설사 등이 나타납니다.

간질성 폐렴: 계단을 오르거나, 조금 무리하면 호흡 곤란·숨이 참, 마른 기침, 발열 등을 보이며, 이들 증상이 갑자기 나타나거나 지속된다.

천식: 숨을 쉴 때 색색, 휘휘과 같은 소리가 나며, 답답함 등의 증상을 보인다.

●복용 후 다음 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상의 지속 또는 증강을 보인 경우에는 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것.

졸음

●5~6회 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 치과 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

### 보관 및 취급상의 주의

직사광선이 닿지 않는 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)

한 포를 나눈 나머지를 복용할 경우는 봉투 입구부분을 접어서 보관하고 2일 이내에 복용하십시오.

사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

31

### 【OTC 의약품의 다언어 제품 정보에 관한 면책사항】

·본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.

·다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.

·다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.

·다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다..