

◆CORRISH是压力大的现代人背部、肩部发硬和疼痛时服用的内服药。可以改善因日常生活中所承受的压力引起的从肩部乃至背部的酸痛症状。●此药剂是根据江户时代汉方医生中山摄州为日本人所调配的处方“治肩背拘急方”制作的汉方制剂。

效能或效果

用于由神经质引起的背部肩部发硬而出现的下述各种症状。肩周炎症、背部肩部的酸痛

用法及用量

在饭前或饭间，请按以下用量并配合水或温开水服用：
成年人（15岁以上），1天3次，1次1包
未满15岁，不宜服用
请严格遵守规定的用法用量。

成分及分量

1包（1.2g）中
Powdered Chikenpaikokyuhō Extract 533.33mg（equivalent to 1333.33mg of Immature citrus unshiu peel, 1000.00mg of Lindera root, 1000.00mg of Zedoary, 133.33mg of Poria sclerotium, 33.33mg of Glycyrrhiza, 1000.00mg of Cyperus rhizome,

添加剂

Talc, Magnesium stearate, Lactose

使用注意事项

咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师治疗的人群

孕妇或有其可能性的人群

老年人

此前因药物等出现过发疹、发红、发痒等症状的人群。

拥有以下症状的人群

浮肿

接受以下诊断的人群

高血压

心脏病

肾脏病

服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医生或药剂师

皮肤：

起疹、发红

发痒

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

假性醛固酮增多症、肌病：除了四肢无力、发麻、抽筋、僵硬等症之外，还出现乏力感、肌肉疼等症状，并且逐渐加重。

●若服用1个月左右后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

●若长期连续服用时，应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质。）

请勿使用超过使用期限的产品。

12

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

·本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。

·多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。

·多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。

·关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任