

◆CORRISH為承受眾多壓力的現代人緩解肩背僵硬、疼痛的口服藥。改善日常生活壓力所引起，由肩膀至後背等部位的僵硬疼痛。●基於江戸時代漢方醫師中山攝州專為日本人調配的「治肩背拘急方」所製漢方製劑。

## 療效或效果

用於神經緊張引起的肩背僵硬等下列各種症狀。肩膀僵硬、肩背疼痛

## 用法及用量

請將以下用量於餐前或餐與餐之間用冷水或微溫水服用：

成人（15歲以上），1天3次，1次1包

未滿15歲者，請勿服用

請務必遵守規定用法、用量。

## 成分及分量

1包（1.2g）中

Powdered Chikenpaikokyuhō Extract 533.33mg（equivalent to 1333.33mg of Immature citrus unshiu peel, 1000.00mg of Lindera root, 1000.00mg of Zedoary, 133.33mg of Poria sclerotium 33.33mg of Glycyrrhiza, 1000.00mg of Cyperus rhizome,

## 添加劑

Talc, Magnesium stearate, Lactose

## 使用上的注意事項

### 諮詢事項

●下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

孕婦或可能懷孕的人。

年長者。

之前曾因藥品等，引發發疹・發紅、發癢等的人。

有下列症狀的人。

浮腫

接受過下列診斷的人。

高血壓

心臟病

腎臟病

服用後，出現下列症狀即可能為副作用影響，請立即停止服用並攜帶本文件諮詢醫生或藥劑師

皮膚：

發疹、發紅

發癢

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

假性醛固酮增多症、肌肉病變：除了手腳乏力、痠麻、抽筋感和僵硬之外，出現無力感、肌肉疼痛，且症狀漸漸變嚴重。

●即使服用1個月左右，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

●長期連續服用的情況下，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

## 保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

請勿使用超過使用期限的產品。

12

### 【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

・本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。

・多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。

・多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。

・关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。