

服用前请务必阅读本说明书。
请妥善保管，以便在需要时能随时阅读。

ACETAMINOPHEN TABLETS s

含有与处方药相同的活性成分[※]

商品名：ACETAMINOPHEN TABLETS s

〈解热镇痛药〉

5 岁起即可服用

2 类药品

- ◆ ACETAMINOPHEN TABLETS s 是一种含有对乙酰氨基酚的解热镇痛药，可缓解发热、头痛和痛经等疼痛。
 - ◆ 5 岁起全家可服用。
 - ◆ 含有与处方药相同的活性成分(※)。
- ※ 含量与处方药不同。



使用注意事项



禁止事项



(若不遵守则会导致当前症状恶化，或容易发生不良反应和事故)

- 1 下述人群请勿服用
 - (1) 因本品或本品的成分发生过敏症状者。
 - (2) 服用本品或其他解热镇痛药、感冒药引起哮喘者。
- 2 服用本品期间，请勿服用以下任一药品
其他解热镇痛药、感冒药、镇静药
- 3 服用前后请勿饮酒
- 4 请勿长期连续使用



咨询事项



- 1 下述人群请在服用前咨询医生、牙科医生、药剂师或注册销售商
 - (1) 正在接受医生或牙科医生治疗者。
 - (2) 孕妇或可能怀孕的人。
 - (3) 老年人。
 - (4) 曾因药物等发生过过敏症状者。
 - (5) 接受以下诊断者。
心脏病、肾病、肝病、胃及十二指肠溃疡
- 2 服用后若出现下述症状，则可能存在不良反应，请立即停止服用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售商

相关部位	症状
皮肤	皮疹或发红、发痒
消化系统	恶心和呕吐、食欲不振
精神神经系统	眩晕
其他	体温过度下降

偶尔可能会出现右侧的严重症状。
此时请立即就医。

症状名称	症状
休克 (过敏反应)	服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音嘶哑、喷嚏、喉咙发痒、憋闷、心悸、意识混浊等。
皮肤黏膜眼综合征 (Stevens-Johnson 综合征)、中毒性表皮 坏死松解症、急性泛发性 发疹性脓疱病	高热、眼睛充血、眼垢、唇部糜烂、喉咙痛、皮肤大面积皮疹和发红、变红的皮肤上出现细小粒状物(小脓包)、浑身发倦、无食欲等持续或急剧恶化。
药物超敏反应综合征	可能会出现皮肤大面积发红、全身皮疹、发热、身体乏力、淋巴结(如颈部、腋下、腹股沟等)肿大等症状。
肝功能损害	出现发热、发痒、皮疹、黄疸(皮肤或眼白发黄)、小便黄赤、浑身发倦、食欲不振等症状。
肾损害	出现发热、皮疹、尿量减少、全身肿胀、全身疲劳、关节痛(关节疼痛)和腹泻等症状。
间质性肺炎	上楼梯或略微用力过度时感到气短和憋闷、出现干咳、发热等，并且这些症状突然或持续出现。
哮喘	呼吸时发出鼾声和啼鸣声，出现憋闷等。

- 3 如果服用 5~6 次症状仍未改善，请停止服用，并携带本说明书咨询医生、牙科医生、药剂师或注册销售商

功效

- ◆ 头痛、月经痛（痛经）、牙痛、拔牙后的疼痛、腰痛、肩肌僵直疼痛、肌痛、关节痛、撞伤痛、挫伤相关痛（挫伤痛）、骨折痛、外伤痛、神经痛、咽喉痛（喉咙痛）、耳痛的镇痛
- ◆ 寒战（发热引起的发冷）、发热时的解热



头痛



痛经






发热



牙痛

用法用量

请尽量避免空腹，用水或温水服用以下剂量。请间隔4小时以上服用。

年龄	1次量	服用次数
成人 (15岁及以上)	3片 	每天最多3次
11岁~14岁	2片 	
5岁~10岁	1片 	
未满5岁	请勿服用	

[注意事项]

- (1) 请严格遵守规定的用法用量。
- (2) 儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。
- (3) 片剂的取出方法
如图所示，以指尖用力按压装有片剂的PTP板凸起部分，弄破背面的铝箔，取出药片服用。（如果误吞包装，可能会导致刺破食管黏膜等意外事故发生）

〈片剂取出示意图〉



请这样服用

疼痛出现后请
尽早服用



成人每次3片，
用1杯水或温水
送服



请尽量在吃东
西或喝饮料后
服用，以避免
空腹服用



成分


9片中

成分	含量	作用
对乙酰氨基酚	900 mg	作用于中枢神经，抑制发热、头痛和痛经等疼痛。

辅料：无水硅酸、纤维素、交联羧甲基纤维素钠、羟丙基纤维素、氢化油、硬脂酸镁

储存及操作注意事项

- (1) 请存放在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。
- (2) 请存放在儿童接触不到的地方。
- (3) 请勿更换其他容器。（否则会造成误用或变质）
- (4) 请勿服用超过使用期限的产品。此外，即使在使用期限内，开封后请在6个月内服用。（为保证质量）



【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。