

복용 전에 이 설명서를 반드시 읽으십시오.
또한, 필요할 때 읽을 수 있도록 보관하십시오.

ACETAMINOPHEN TABLETS s

의료용 의약품과 동일한 유효 성분 함유* 제품명: ACETAMINOPHEN TABLETS s
<해열 진통제>

5세부터 복용 가능

제2류 의약품(일반의약품)

- ◆ACETAMINOPHEN TABLETS s는 발열 및 두통·생리통 등의 통증을 완화하는 아세트아미노펜이 함유된 해열진통제입니다.
 - ◆5세부터 가족이 함께 복용할 수 있습니다.
 - ◆의료용 의약품과 동일한 유효 성분을 함유(※)하고 있습니다.
- ※의료용 의약품과 분량은 다릅니다



사용 시 주의 사항



금지 사항

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용·사고가 일어날 수 있습니다)

- 다음과 같은 사람은 복용하지 마십시오
 - 본 약제 또는 본 약제의 성분으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.
 - 본 약제 또는 다른 해열 진통제, 감기약을 복용하고 천식을 일으킨 적이 있는 사람.
- 본 약제를 복용하는 동안에는 다음 의약품을 복용하지 마십시오
다른 해열진통제, 감기약, 진정제
- 복용 전후에는 음주하지 마십시오
- 장기간 복용하지 마십시오



상담

- 다음과 같은 사람은 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오
 - 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.
 - 임부 또는 임신 중이라고 생각되는 사람.
 - 고령자.
 - 약물 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.
 - 다음 진단을 받은 사람.
심장 질환, 신장 질환, 간 질환, 위 및 십이지장 궤양
- 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우 부작용일 수 있으므로 즉시 복용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오

관련 부위	증상
피부	발진·발적, 가려움
소화기	메스꺼움·구토, 식욕 부진
정신신경계	현기증
기타	과도한 체온 저하

드물게 오른쪽에 기재된 위중한 증상이 나타날 수 있습니다.
이 경우 즉시 의사에게 진료를 받으십시오.

증상 명칭	증상
쇼크 (아나필락시스)	복용 후 바로 피부 가려움, 두드러기, 목 심, 재채기, 목구멍 가려움, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 증상이 발현한다.
피부 점막안 증후군 (스티븐스존슨 증후군), 중독성 표피 괴사 용해증, 급성 범발성 발진성 농포증	고열, 눈 충혈, 눈곱, 입술 짓무름, 인후통, 피부의 광범위한 발진·발적, 빨개진 피부에 작고 도물도물한 것(작은 농포)이 생김, 전신의 나른함, 식욕이 없는 증상 등이 지속되거나 급격히 악화된다.
약물 과민 반응 증후군	넓은 부위에 피부가 붉어짐, 전신 발진, 발열, 몸이 나른함, 림프절(목, 겨드랑이, 사타구니 등) 부종 등이 나타난다.
간 기능 장애	발열, 가려움, 발진, 황달(피부 및 눈 흰자가 노랗게 변함), 갈색뇨, 전신의 나른함, 식욕 부진 등의 증상이 나타난다.
신장 장애	발열, 발진, 소변량 감소, 전신 부종, 전신 나른함, 관절통(마디 통증), 설사 등이 나타난다.
간질성 폐렴	계단을 오르거나 조금 무리하면 호흡 곤란·숨이 참, 마른 기침, 발열 등을 보이며, 이들 증상이 갑자기 나타나거나 지속된다.
천식	숨을 쉴 때 색색, 휘휘과 같은 소리가 나며 답답함 등의 증상을 보인다.

- 5~6회 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 치과의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오

효능

- ◆ 두통·월경통(생리통)·치통·발치 후 통증·요통·어깨 결림 통증·근육통·관절통·타박통·염좌에 동반되는 통증(염좌통)·골절통·외상통·신경통·인후통(목 통증)·귀 통증의 진통
- ◆ 오한(발열로 인한 오한) 및 발열 시 해열



용법·용량

다음 용량을 가급적 공복일 때를 피해 물 또는 미지근한 물과 함께 복용하십시오. 복용 간격은 4시간 이상 두십시오.



연령	1회 용량	복용 횟수
성인 (15세 이상)	3정	1일 3회까지
11세~14세	2정	
5세~10세	1정	
5세 미만	복용 금지	

[주의]

- (1) 정해진 용법·용량을 반드시 준수하십시오.
- (2) 어린이가 복용하는 경우 보호자의 지도 감독 하에 복용해야 합니다.
- (3) 정제 꺼내는 방법
그림과 같이 정제가 들어 있는 PTP시트의 돌출부를 손가락 끝으로 세게 눌러 뒷면의 알루미늄 호일이 찢어지면 꺼내서 복용하십시오.
(실수로 그대로 삼키면 식도 점막이 찢리는 등 예상치 못한 사고로 이어질 수 있습니다)



이렇게 복용하십시오



성분


9정 중

성분	분량	효능
아세트아미노펜	900mg	중추신경에 작용하여 발열 및 두통·생리통과 같은 통증을 완화합니다.

첨가물: 무수 규산, 셀룰로오스, 크로스 CMC Na, 하이드록시프로필 셀룰로오스, 경화유, 스테아린산 마그네슘

보관 및 취급 시 주의 사항

- (1) 직사광선이 닿지 않는 서늘하고 습하지 않은 곳에 보관하십시오.
- (2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (3) 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. (오용의 원인이 되거나 품질 유지가 곤란할 수 있습니다)
- (4) 사용기한이 지난 제품은 복용하지 마십시오. 사용기한이 지나지 않았어도 개봉 후에는 6개월 이내에 복용하십시오. (품질 유지를 위해)



[다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항]

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.