

服用前請務必閱讀本說明書。  
此外，請妥善保管以備不時之需。

# ACETAMINOPHEN TABLETS s

含有與醫療級醫藥品相同的有效成分<sup>※</sup>

銷售名稱：ACETAMINOPHEN TABLETS s

〈解熱鎮痛藥〉

5 歲以上即可服用

第二類醫藥品

- ◆ ACETAMINOPHEN TABLETS s 是含有乙醯胺酚，可緩解發燒及頭痛、生理痛等疼痛的解熱鎮痛藥。
  - ◆ 5 歲以上即可服用，適合全家人。
  - ◆ 含有與醫療級醫藥品相同的有效成分(※)。
- ※分量與醫療級醫藥品不同



## 使用上的注意事項



### 禁止事項



(若不遵守，可能導致目前的症狀惡化，或者容易引發副作用、意外)

- 1** 符合下列情形者請勿服用
  - (1) 曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。
  - (2) 曾因服用本藥劑或其他解熱鎮痛藥、感冒藥而引起氣喘者。
- 2** 服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品  
其他解熱鎮痛藥、感冒藥、鎮靜藥
- 3** 服用前後請勿飲酒
- 4** 請勿長期連續使用



## 諮詢事項



- 1** 下列人士服用前，請先諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者
  - (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療者。
  - (2) 孕婦或可能懷孕者。
  - (3) 老年人。
  - (4) 曾因藥物等引發過敏症狀者。
  - (5) 受診斷為患有下列疾病者。  
心臟病、腎臟病、肝臟病、胃潰瘍、十二指腸潰瘍

- 2** 服用後，出現下列症狀即可能為副作用，請立即停止服用，並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

| 相關部位   | 症狀         |
|--------|------------|
| 皮膚     | 出疹、發紅、發癢   |
| 消化器官   | 噁心、嘔吐、食慾不振 |
| 精神神經系統 | 暈眩         |
| 其他     | 體溫過低       |

曾發生如右罕見嚴重症狀。  
如遇到此類情況，請立刻接受醫師診療。

| 症狀名稱                            | 症狀   |
|---------------------------------|--|
| 休克<br>(過敏性)                     | 服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。                             |
| 史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死融解症、急性廣泛性發疹性膿疱症 | 發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍出疹、發紅、變紅的皮膚上出現小顆粒(小膿疱)、全身倦怠、沒食慾等症狀持續，或者突然惡化。 |
| 藥物過敏症候群                         | 出現皮膚廣範圍發紅、全身性出疹、發燒、倦怠感、淋巴結(頸部、腋下、鼠蹊部等)腫脹等。                             |
| 肝功能障礙                           | 出現發燒、發癢、出疹、黃疸(皮膚和眼白變黃)、褐色尿、全身倦怠、食慾不振等情況者。                              |
| 腎功能障礙                           | 出現發燒、出疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛(各關節疼痛)、腹瀉等。                                 |
| 間質性肺炎                           | 爬樓梯或稍微勉強身體，就會突然出現氣短、呼吸困難、乾咳、發燒等，或這些症狀持續。                               |
| 氣喘                              | 呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。  |

- 3** 若服用 5~6 次症狀卻未見改善，請停止服用，並攜帶本說明書諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者




## 療效

- ◆頭痛、月經痛（生理痛）、牙痛、拔牙後的疼痛、腰痛、肩膀痠痛、肌肉疼痛、關節痛、撞傷痛、扭傷伴隨的疼痛（扭傷痛）、骨折痛、外傷痛、神經痛、咽喉痛（喉嚨痛）、耳朵痛的鎮痛
- ◆畏寒（發燒引起的身體寒冷）、發燒時的解熱



## 用法及用量

以冷開水或溫水服用以下的量，並盡量避免於空腹時服用。每次服用請間隔 4 個小時以上。

| 年齡             | 1 次量  | 服用次數      |
|----------------|---|-----------|
| 成人<br>(15 歲以上) | 3 錠  | 1 天最多 3 次 |
| 11 歲~14 歲      | 2 錠  |           |
| 5 歲~10 歲       | 1 錠  |           |
| 未滿 5 歲         | 不可服用  |           |

【注意】

- (1)請務必遵守規定用法、用量。
- (2)若為兒童服用，請在家長的指導和監督下服用。
- (3)錠劑取出方法

如圖所示，以指尖用力按壓裝有錠劑之 PTP 泡殼的凸出部位，使鋁箔背膜破裂後取出服用。（不慎誤食包裝將可能造成刺傷食道黏膜等意外事故發生）

〈錠劑取出圖〉



請依照以下說明服用

開始疼痛時及早服用



成人 1 次以 1 杯冷開水或溫水服用 3 錠



為了避免空腹時服用，請盡可能於攝取食物或飲料後服用



## 成分

9 錠中

| 成分   | 分量    | 效用                        |
|------|-------|---------------------------|
| 乙醯胺酚 | 900mg | 對中樞神經發揮作用，抑制發燒及頭痛、生理痛等疼痛。 |

添加物：二氧化矽、纖維素、交聯羧甲基纖維素鈉、羥丙基纖維素、硬化油、硬脂酸鎂

## 保管及使用上的注意事項

- (1)請保管於濕度較低的陰涼處，避免日光直射。
- (2)請保管於兒童無法觸及之處。
- (3)請勿換裝至其他容器。（可能造成誤用或產品變質）
- (4)請勿服用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請於 6 個月內服用完畢。（為確保品質）



### 【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。