

Menfula A贴剂中的维生素E和温感成分（nonanoic acid vanillylamide）具有促进血液循环的作用、methyl salicylate等具有消炎止痛作用，因此可以缓解肩部酸痛、腰部疼痛。

## 效能或效果

肌肉疲劳  
关节痛、腰痛、肌肉痛、肩部酸痛、跌打痛、骨折疼痛、挫伤疼痛、冻疮口

## 用法及用量

请揭下内衬膜（塑料薄膜），1天1~2次粘贴于患处。  
请严格遵守规定的用法用量。  
儿童使用时应在监护人指导监督下使用。  
出汗或患处弄湿时，擦拭干净后再使用。  
正在粘贴的患处不要使用电暖桌或电热毯等进行保暖。  
皮肤特别弱的人群，请避免连续贴在同一部位。  
皮肤较弱易起斑疹的人群应在使用前取小片贴在上臂内侧部位半天以上，确认没有起疹发红、发痒等症状后使用。  
使用本药剂后，出现极其强烈的发痒或痛感时，请停止使用。  
请勿贴着本药剂或刚刚撕下后洗澡。（可能会有很强的刺激效果，因此至少在洗澡1小时前撕下，洗澡后过30分钟左右再使用）

## 成分及分量

1平方米中（每144.81 g 膏体）  
Tocopherol Acetate 0.5g  
Nonanoic acid vanillylamide 0.01g  
Methyl Salicylate 9g  
l-Menthol 4.5g  
dl-Camphor 1.8g  
Mentha oil 1.2g

## 添加剂

Rubber latex, Methyl acrylate, 2-ethylhexyl acrylate copolymer, Polyoxyethylene nonylphenyl ether, Polybutene, Raw rubber, Polyisobutylene, Calcium carbonate, Ester gum, Terpene resin, Titanium oxide, Permanent Red F5R, flavor

## 使用注意事项

### 禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）  
● 下述人群不要使用  
因天然橡胶引起过过敏症状的人群  
● 不要用于下述部位  
眼睛周围、粘膜等。  
湿疹、斑疹、伤口

### 咨询事项

● 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者  
因药物等出现过过敏症状的人群  
● 使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止使用，并携带本箱子咨询医师、药剂师或登录贩卖者  
皮肤：  
起疹、发红  
发痒  
疼痛  
● 若使用5~6天后症状仍无改善则应中止使用，并携带本箱子咨询医师、药剂师或登录贩卖者

## 保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射的阴凉场所  
请保管在儿童无法触及的地方。  
请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质。）  
未使用的部分请放进袋子，并将开口折好保管  
请勿使用超过使用期限的产品。且，即使在使用期限内，开封后请尽快使用。（为了保证质量）

**【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】**

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任