

メンフラA

第三類医薬品
収れん・消炎薬（パップ剤を含む）

メンフラAはビタミンEと温感成分（ノニル酸ワニルアミド）による血行促進作用や、サリチル酸メチルなどによる消炎・鎮痛作用で、肩のこり・腰の痛みをやわらげる貼り薬です。

効能・効果

筋肉疲労
関節痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・しもやけ

用法・用量

ライナー（プラスチックフィルム）をはがし、患部に1日1～2回貼ってください。
定められた用法・用量を厳守してください。
小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
汗をかいたり、患部がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。
貼ったまま患部をこたつや電気毛布等で温めないでください。
皮ふのとくに弱い人は、同じ部位に続けて貼ることをさけてください。
皮ふが弱くかぶれやすい人は、使用前に小片を腕の内側に半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみなどの症状が起きないことを確かめてから使用してください。
本剤の使用により、とくに強いかゆみや痛みがでた場合には使用を中止してください。
本剤を貼ったまま、あるいははがした直後に入浴しないでください。（強い刺激を感じることがありますので、少なくとも入浴の1時間前にははがし、入浴後は30分程してから使用してください）

成分及び分量

1 m 2 中（膏体144.81gあたり）
トコフェロール酢酸エステル 0.5g
ノニル酸ワニルアミド 0.01g
サリチル酸メチル 9g
l-メントール 4.5g
dl-カンフル 1.8g
ハッカ油 1.2g

添加物

ゴムラテックス、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシルコポリマー、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、炭酸カルシウム、エステルガム、テルペン樹脂、酸化チタン、赤色405号、香料

使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）
● 次の人は使用しないこと
天然ゴムによるアレルギー症状を起こしたことがある人
● 次の部位には使用しないこと
目の周囲、粘膜等。
湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

● 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
● 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
皮膚：
発疹・発赤
かゆみ
痛み
● 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

直射日光を避け、涼しい所に保管してください
小児の手のとどかない所に保管してください。
他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）
未使用分は袋に入れ、開封口を折りまげて保管してください
使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。（品質保持のため）

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。