

MENFULA A

第三類醫藥品
鎮痛、鎮癢、收斂、消炎藥（包
含泥敷劑）

Menfula A 痠痛貼布所含具促進血液循環作用的維生素E與溫熱成分（nonanoic acid vanillylamide）、具消炎及鎮痛作用的methyl salicylate等成分緩和肩膀僵硬、腰痛。

療效或效果

肌肉疲勞
關節痛、腰痛、肌肉疼痛、肩膀痠痛、撞傷痛、骨折痛、扭傷痛、凍瘡口

用法及用量

將內層(塑料薄膜)撕下，1天1~2次貼於患處。
請務必遵守規定用法、用量。
使兒童使用的情況下，請在家長的指導監督下使其使用。
如出汗或患部潮濕時，請將其擦拭乾淨後再行使用。
請勿以暖被桌或電毯等溫熱貼有貼布的患部。
皮膚特別敏感脆弱者，請避免持續黏貼於同一部位。
皮膚敏感脆弱或易出現斑疹者，使用前建議於手臂內側黏貼小片貼布半天以上，確認並未出現出疹、發紅、搔癢等症狀後再行使用。
如因使用本藥劑而導致嚴重搔癢或疼痛時，請立即停止使用。
請勿於貼著本藥劑的狀態下或撕除後馬上入浴。（可能感到強烈刺激感，最少應於入浴前1小時撕除或於入浴後30分鐘左右再行使用）

成分及分量

1平方米中（每144.81g膏狀物）
Tocopherol Acetate 0.5g
Nonanoic acid vanillylamide 0.01g
Methyl Salicylate 9g
l-Menthol 4.5g
dl-Camphor 1.8g
Mentha oil 1.2g

添加劑

Rubber latex, Methyl acrylate, 2-ethylhexyl acrylate copolymer, Polyoxyethylene nonylphenyl ether, Polybutene, Raw rubber, Polyisobutylene, Calcium carbonate, Ester gum, Terpene resin, Titanium oxide, Permanent Red F5R, flavor

使用上的注意事項

禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）
●下列的人請勿使用
曾因天然橡膠引發過敏症狀者
●請勿使用於下列部位
眼睛周圍、黏膜等。
濕疹、斑疹、傷口。

諮詢事項

●下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
曾因藥品等，引發過敏症狀的人。
●使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此箱子，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚：
發疹、發紅
發癢
疼痛
●即使使用5~6天，症狀也沒有改善的情況下，請停止使用，攜帶此箱子，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射的陰涼處保管
請置於兒童無法觸及之處保管。
請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）
未使用部分請裝回原包裝外袋，並將袋口反折保管
請勿使用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早使用完畢。（為確保品質）

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。