

メンフラフェルビナク〈温感〉

メンフラフェルビナク〈温感〉

第2類医薬品

⚠️【使用上の注意】

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4)15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。
- (3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、痛み、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効 能】

関節痛、筋肉痛、腰痛、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み

【用法・用量】

表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

【注意】

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、痛み等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (5)汗をかいたり皮膚がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。
- (6)強い刺激を感じることがありますので、入浴時の30分以上前にはがしてください。また、入浴後は30分位してから使用してください。
- (7)本剤に触れた手で、眼、鼻腔、口唇等の粘膜に触れないよう注意してください。

【成分】 膏体 100g 中

フェルピナク..... 3.5g

ノニル酸ワニルリアミド..... 0.025g

添加物：スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、流動パラフィン、その他4成分

[1枚あたり膏体量1g]

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)

(4)品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、開封口をきちんと折り曲げて保管してください。

(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
大正製薬(株) お客様119番室
電話 03-3985-1800
受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元 **大正製薬株式会社**²¹
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

製造 **共立薬品工業株式会社**
販売元 奈良県高市郡高取町清水谷1085番地

— 本文は、直接外箱に記載されている事項です —