



お口にしみにくい

レビオ [第3類医薬品]
(**口唇用薬**)

◆レビオは使いやすい携帯用の塗布薬で、口唇のひびわれや口内炎に効果をあらわします。また本品は口内の粘膜や舌に、しみにくいのでお子さまにも適しています。



使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください

1才未満の乳児。^{*}



相談すること



① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。

② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ

③ 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能

口唇のひびわれ・ただれ、口内炎、舌炎

こんな症状に

◆唇のひびわれ・ただれ

寒さや発熱のためにひびわれが起きたり、唇の両端が白くただれ、口を開くと痛んだりします。



◆口内炎

口の中の粘膜が赤くはれ、熱いもの、すっぱいものを口にいれると痛みます。



◆舌炎

舌が炎症を起こしてしまいます。



用法・用量

適量を患部に塗布してください。

- * キャップをとり、容器の先端を患部に軽く押し当てながら塗布してください。
- * 夜おやすみ前は口紅などをきれいに落としてから塗布してください。なお、直接塗布しにくい部位には、本品を清潔なガーゼにひたして、口中や舌に塗布します。
- * 口内の汚れをとるためにうがいをしたのち、レビオを塗布すると更に効果的です。

[注意]

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 本剤は口腔用にのみ使用し、眼科用その他に使用しないでください。

成 分

100g中

成 分	分 量	はたらき
パンテノール	0.3g	粘膜の炎症をおさえます。
アラントイン	0.2g	傷の治りをはやめます。
グリセリン	42g	傷ついた粘膜面を保護します。
ハチミツ	42g	製剤の苦みをおさえます。

添加物：パラベン、安息香酸Na、エデト酸Na、pH調節剤

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。



(2) 小児の手の届かない所に保管してください。



(3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)



(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべくはやく使用してください。(品質保持のため)



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<http://www.taisho.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 : 0120-149-931(フリーダイヤル)