

◆LABIO是易使用的便携式外敷药，对嘴唇的皴裂以及口腔溃疡有改善效果。此外，本产品不容易刺激口腔内部的粘膜以及舌头部位，因此也适合儿童使用。

效能或效果

嘴唇的皴裂、糜烂、口腔溃疡、舌炎

用法及用量

请取适量涂抹于患处。
请严格遵守规定的用法用量。
儿童使用时应在监护人指导监督下使用。
本药剂仅限用于口腔，请不要用于口腔以外的部位。

成分及分量

100 g 中
Panthenol 0.3g
Allantoin 0.2g
Glycerin 42g
Honey 42g

添加剂

Butyl parahydroxybenzoate, Sodium benzoate, Edetate sodium, pH adjusting agent

使用注意事项

禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用)

●下述人群不要使用
未满1岁的婴幼儿。

咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
正在接受医师治疗的人群
因药物等出现过过敏症状的人群
湿润或糜烂较为严重的人群。
使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者
皮肤：
起疹、发红
发痒
●若使用5~6天后症状仍无改善则应中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

保管在避免阳光直射（潮气小）的阴凉场所（密闭）。
请保管在儿童无法触及的地方。
请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）
请勿使用超过使用期限的产品。
且，即使在使用期限内，开封后请尽快使用。（为了保证质量）

51

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任