

◆レビオは使いやすい携帯用の塗布薬で、口唇のひびわれや口内炎に効果をあらわします。また本品は口内の粘膜や舌に、しみにくいのでお子さまにも適しています。

## 効能・効果

口唇のひびわれ・ただれ、口内炎、舌炎

## 用法・用量

適量を患部に塗布してください。  
定められた用法・用量を厳守してください。  
小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。  
本剤は口腔用のみ使用し、口腔用以外には使用しないでください。

## 成分及び分量

100g中  
パンテノール 0.3g  
アラントイン 0.2g  
グリセリン 42g  
ハチミツ 42g

## 添加物

パラベン,安息香酸Na,エドト酸Na,pH調節剤

## 使用上の注意

### してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 次の人は使用しないこと  
1歳未満の乳児。

### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
医師の治療を受けている人。  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
湿潤やただれのひどい人。  
使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
皮膚：  
発疹・発赤  
かゆみ
- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない（湿気の少ない）涼しい所に（密栓して）保管すること。  
小児の手のとどかない所に保管してください。  
他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）  
使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。  
なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。（品質保持のため）

51

### 【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。