

◆LABIO為方便使用的攜帶型外用塗抹藥液，對於口唇乾裂、口腔炎發揮效果。此外，溫和和不刺激，可用於口腔黏膜及舌部，兒童亦適用。

療效或效果

嘴唇乾裂、嘴唇潰爛、口腔炎、舌炎

用法及用量

請適量地塗抹於患處。
請務必遵守規定用法、用量。
使兒童使用的情況下，請在家長的指導監督下使其使用。
本藥劑僅供口腔使用，請勿用於口腔以外的部位。

成分及分量

100g中
Panthenol 0.3g
Allantoin 0.2g
Glycerin 42g
Honey 42g

添加劑

Butyl parahydroxybenzoate, Sodium benzoate, Edetate sodium, pH adjusting agent

使用上的注意事項

禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用)
●下列的人請勿使用
未滿1歲的嬰兒。

諮詢事項

●下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
正在接受醫師治療的人。
曾因藥品等，引發過敏症狀的人。
浸潤和潰爛嚴重的人。
使用後，出現下列症狀即可能為副作用影響，請立即停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚：
發疹、發紅
發癢
●即使使用5~6天，症狀也沒有改善的情況下，請停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請保管於陽光直射不到（濕氣少）的陰涼處（蓋緊）。
請置於兒童無法觸及之處保管。
請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）
請勿使用超過使用期限的產品。
此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早使用完畢。（為確保品質）

51

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- ・本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- ・多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- ・多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- ・关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。