

パブロンSa<微粒>

◆パブロンSa<微粒>は、たんを出しやすくするブロムヘキシン塩酸塩を配合したかぜ薬です。■8つの有効成分を配合し、たん、のどの痛みなど11のかぜの諸症状に効果をあらわすかぜ薬です。■家庭の常備薬としてご使用ください。

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

次の量を食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用してください。

15才以上、1回1包、1日3回

11才～14才、1回2/3包、1日3回

7才～10才、1回1/2包、1日3回

3才～6才、1回1/3包、1日3回

1才～2才、1回1/4包、1日3回

1歳未満、服用しないこと

定められた用法・用量を厳守してください。

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分及び分量

1包(1.2g)中

ブロムヘキシン塩酸塩 4mg

デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg

dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg

アセトアミノフェン 300mg

マレイン酸カルピノキサミン 2.5mg

無水カフェイン 25mg

ビスイブチアミン 8mg

リボフラビン 4mg

添加物

無水ケイ酸,D-マンニトール,ヒドロキシプロピルセルロース,ステアリン酸Mg,グリチルリチン酸2K,香料,バニリン

成分及び分量に関連する注意

本剤の服用により、尿が黄色になることがあります。これは本剤中のビタミンB2によるもので、ご心配ありません

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

次の人は服用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

●服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気等があらわれることがある。)

服用前後は飲酒しないでください

●長期連用しないこと

相談すること

●次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

医師又は歯科医師の治療を受けている人。

妊婦又は妊娠していると思われる人。

授乳中の人。

高齢者。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

次の症状のある人。

高熱

排尿困難

次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害

糖尿病

心臓病

高血圧

肝臓病
腎臓病
胃・十二指腸潰瘍
緑内障

●服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

皮膚：
発疹・発赤

かゆみ

消化器：

吐き気

嘔吐

食欲不振

精神神経系：

めまい

呼吸器：

息切れ

息苦しさ

泌尿器：

排尿困難

その他：

過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

ショック（アナフィラキシー）：服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症：高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

腎障害：発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。

間質性肺炎：階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。ぜんそく：息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

●服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

眠気

口のかわき

●5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

小児の手のとどかない所に保管してください。

他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）

1包を分割した残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

期限を過ぎた製品は服用しないでください

11

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。