

パブロンゴールドA<錠>
使用上の注意改訂のお知らせ

本製品の使用上の注意を下記のとおり改訂いたします。

つきましては、改訂内容をご確認いただき、本製品の適正使用をお願い申し上げます。

記

<改訂内容>

| 改訂前 | | 改訂後（___：改訂箇所） | |
|---|------|---|---|
| <p>「相談すること」 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください ・ ・ ・ ・ ・ まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</p> | | <p>「相談すること」 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください ・ ・ ・ ・ ・ まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</p> | |
| 症状の名称 | 症状 | 症状の名称 | 症状 |
| （新設） | （新設） | 薬剤性過敏症症候群 | 皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節（首、わきの下、股の付け根等）のはれ等があらわれる。 |

以上