

PABRON GOLD A <TABLETS>

指定第二类医药品
感冒药

◆PABRON GOLD A (药片)是含有guaifenesin在内7种有效成分的感冒药,可以改善咳嗽、痰、咽喉疼痛等各种感冒症状。●请作为家庭常备药使用。

效能或效果

缓解各类感冒症状(鼻涕、鼻塞、喷嚏,咽喉疼痛、咳嗽、咳痰、恶寒、发烧、头疼、关节痛、肌肉疼痛)

用法及用量

请尽量在饭后30分以内,按以下用量并配合水或温开水服用:

15岁以上,1天3次,1次3片

12岁~14岁:2片:1天3次

未满12岁:请勿服用

请严格遵守规定的用法用量。

儿童服用时,请在监护人的指导监督下服用。

请不要将用湿手等触摸过的药片放回药瓶中。(有可能会成为变色等原因,导致质量改变)

成分及分量

3片中

Guaifenesin 60mg

Dihydrocodeine Phosphate 8mg

dl-Methylephedrine Hydrochloride 20mg

Acetaminophen 300mg

Chlorpheniramine Maleate 2.5mg

Anhydrous caffeine 25mg

Riboflavin 4mg

添加剂

cellulose,anhydrous silicic acid ,Magnesium aluminometasilicate ,Hydroxypropylcellulose,Sodium starch glycolate,Lactose ,Magnesium stearate,hardened oil,flavor,Vanillin,Benzyl benzoate

成分及分量相关注意

服用本药剂,可能会出现尿液变黄的情况,这是因本药剂中的维生素B2引起的现象,因此不用担心

使用注意事项

禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化,或容易出现副作用及事故)

下述人群请不要服用

因为本药剂或本药剂的成分引起过过敏症状的人群。

因服用本药剂或其他感冒药、解热镇痛药而引发过哮喘的人群

未满12岁的儿童

在服用本药剂期间,不要服用下述任何药物。

其他感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、含抗组胺剂的内服药等(鼻炎用内服药、晕车药、抗过敏药等)

●服用后不要驾驶交通工具或操作机械类(会出现嗜睡症状)

处于哺乳期时不要服用本药剂,或在服用本药剂时不要进行哺乳

请不要在服用前后饮酒

●不要长期连续服用

咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师或牙科医师治疗的人群

孕妇或有其可能性的人群

老年人

因药物等出现过过敏症状的人群

拥有以下症状的人群

高烧

排尿困难

接受以下诊断的人群

甲状腺功能障碍

糖尿病

心脏病

高血压

肝脏病

肾脏病

胃及十二指肠溃疡

青光眼
呼吸功能障碍、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、肥胖症
●服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

皮肤：
起疹、发红
发痒

消化系统：
恶心
呕吐
食欲不振

精神神经系统：
头晕

泌尿系统：
排尿困难

其他：
体温过低

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

休克（过敏性）：服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。

史提芬强生症候群、中毒性表皮坏死松解症、急性泛发性发疹性脓疱病：高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹、发红、发红皮肤上出现小脓包、全身无力、没有食欲等症状持续或急剧恶化。

肝功能障碍：出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。

肾损伤：出现发烧、尿量减少、全身浮肿、全身无力、关节痛（各关节疼痛）、腹泻等症状。

间质性肺炎：上楼或因劳累而出现气短、气闷、空咳嗽、发烧，并且突然出现或长时间持续。

哮喘：呼吸时出现哮鸣音、气闷等情况。

再生障碍性贫血：出现淤青、鼻血、牙龈出血、发烧、皮肤或粘膜发白、疲劳感、心悸、气短、身体不适，难以站稳、血尿等症状。

粒细胞缺乏症：出现突发高烧、发冷、咽喉疼痛等症状。

呼吸阻碍：出现气短、气闷等症状

●服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

便秘、嗜睡
口腔干燥

●若服用5~6次后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射的阴凉场所密封保管。
请保管在儿童无法触及的地方。
请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）
请勿服用超过使用期限的产品。此外，即使在使用期限内，开封后请在6个月以内服用。（为了保证质量）

41

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担一切责任