

効 能

かぜの諸症状(のどの痛み、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み、たん)の緩和

用法・用量

次の量を食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用してください。

年 令	1 回 量	服用回数
15才以上	4錠 	1日3回
15才未満	服用しないこと	

【注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) ぬれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないでください。(変色等の原因となり、品質が変わることがあります)

最初に服用する時に

★詰め物を取り出して捨ててください。
(この詰め物は輸送時の錠剤の破損を防ぐためのものです。これをびんに出し入れすると、異物混入の原因になることがあります)



成 分

4錠中

成 分	分量	はたらき
アセトアミノフェン	150 mg	発熱、頭痛、のどの痛み等、熱と痛みをしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	80 mg	のどにからんだたんを、やわらかくして出しやすくします。
麦門冬湯乾燥エキス (下記生薬の抽出乾燥エキス)	600 mg	のど粘膜の乾燥を潤し、たんをきれやすくする働きがあります。
バクモンドウ(麦門冬) 533.3 mg (12錠中1600mg) カンゾウ(甘草) 133.3 mg (12錠中 400mg) コウベイ(梗米) 666.7 mg (12錠中2000mg) タイソウ(大棗) 200 mg (12錠中 600mg) ニンジン(人參) 133.3 mg (12錠中 400mg) ハンゲ(半夏) 333.3 mg (12錠中1000mg)		

添加物：無水ケイ酸、ケイ酸Al、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、トウモロコシデンプン

【注意】

本剤は生薬を原料として使用していますので、製品により色調等が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべくはやく服用してください。(品質保持のため)



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記
にお願い申し上げます。



連 絡 先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電 話 03-3985-1800

受付時間 8:30~17:00(土、日、祝日を除く)

※受付時間の詳細は、大正製薬ホームページにてご確認ください

発 売 元

大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号
<https://brand.taisho.co.jp/pabron/>

製造販売元

ジェーピーエス製薬株式会社

栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)