

# PABRON 50

- ◆PABRON 50 片剂是配合了对咽喉疼痛及发冷等感冒症状有效的西药成分（对乙酰氨基酚、愈创木酚磺酸钾）和有助润喉祛痰的生药成分“麦门冬汤提取物”的感冒药。
- ◆药剂中不含引起嗜睡、口干及排尿困难的成分（抗组胺药物）、容易引起便秘的成分（磷酸二氢可待因）、对糖尿病和高血压产生影响的成分（*d,l*-甲基麻黄碱盐酸盐、麻黄）。

## 效能

缓解感冒的各种症状（咽喉疼痛、恶寒、发烧、头痛、关节痛、肌肉痛、痰）

## 用法及用量

请尽量在饭后 30 分钟以内，按以下用量并配合水或温开水服用。

15 岁以上，1 次 4 片，1 天 3 次

未满 15 岁，请勿服用

### 注意

- 请严格遵守规定的用法用量。
- 请不要将用湿手等触摸过的药片放回药瓶中。（有可能会成为变色等原因，导致质量改变）

## 成分

4 錠中

乙酰氨基酚 150mg

愈创木酚磺酸钾 80mg

麦门冬汤提取物颗粒 600mg

（以下生药的干燥提取物）

（麦门冬 533.3mg（12 片中 1600mg），甘草 133.3mg（12 片中 400mg），粳米 666.7mg（12 片中 2000mg），大枣 200mg（12 片中 600mg），人参 133.3mg（12 片中 400mg），半夏 333.3mg（12 片中 1000mg））

### 添加剂

二氧化硅，硅酸铝，羧甲基纤维素钙，硬脂酸镁，玉米淀粉

### 注意

本药剂使用生药作为原料，因此不同产品的颜色等会有所不同，但效果不会发生改变。

## 使用注意事项

### 禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）

- 下述人群不要服用  
因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群。  
因服用本药剂或其他感冒药、解热镇痛药而引发过哮喘的人群。
- 在服用本药剂期间，不要服用下述任何药物  
其他感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药
- 请不要在服用前后饮酒
- 不要长期连续服用

### 咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者  
正在接受医师或牙科医师治疗的人群。  
孕妇或有其可能性的人群。  
因药物等出现过过敏症状的人群。  
拥有以下症状的人群。  
高烧  
接受以下诊断的人群。  
心脏病，肝脏病，肾脏病，胃及十二指肠溃疡
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者  
皮肤：起疹、发红，发痒  
消化系统：恶心、呕吐，食欲不振  
精神神经系统：头晕

其他：体温过低

- 偶尔会出现如右文所述的重症。此时请立即就医。

休克（过敏性）：服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。

史提芬强生症候群、中毒性表皮坏死松解症、急性泛发性发疹性脓疱病：高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹、发红、发红皮肤上出现小脓包、全身无力、没有食欲等症状持续或急剧恶化。

肝功能障碍：出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。

肾损伤：出现发烧、尿量减少、全身浮肿、全身无力、关节痛（各关节疼痛）、腹泻等症状。

间质性肺炎：上楼或因劳累而出现气短、气闷、空咳嗽、发烧，并且突然出现或长时间持续。

哮喘：呼吸时出现哮鸣音、气闷等情况。

- 若服用 5~6 次后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

## 保管及使用注意事项

- 保管在避免阳光直射潮气小的阴凉场所密闭。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）
- 请勿服用超过使用期限的产品。另外，即使在服用期限内，开封后请尽快服用完。（为了保证质量）

21

### 【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。