

PABRON 50

- ◆PABRON 50 片剂是配合了对咽喉疼痛及发冷等感冒症状有效的西药成分（对乙酰氨基酚、愈创木酚磺酸钾）和有助润喉祛痰的生药成分“麦门冬汤提取物”的感冒药。
- ◆药剂中不含引起嗜睡、口干及排尿困难的成分（抗组胺药物）、容易引起便秘的成分（磷酸二氢可待因）、对糖尿病和高血压产生影响的成分（*d,l*-甲基麻黄碱盐酸盐、麻黄）。

效能

缓解感冒的各种症状（咽喉疼痛、恶寒、发烧、头痛、关节痛、肌肉痛、痰）

用法及用量

请尽量在饭后 30 分钟以内，按以下用量并配合水或温开水服用。

15 岁以上，1 次 4 片，1 天 3 次

未满 15 岁，请勿服用

注意

- 请严格遵守规定的用法用量。
- 请不要将用湿手等触摸过的药片放回药瓶中。（有可能会成为变色等原因，导致质量改变）

成分

4 錠中

乙酰氨基酚 150mg

愈创木酚磺酸钾 80mg

麦门冬汤提取物颗粒 600mg

（以下生药的干燥提取物）

（麦门冬 533.3mg（12 片中 1600mg），甘草 133.3mg（12 片中 400mg），粳米 666.7mg（12 片中 2000mg），大枣 200mg（12 片中 600mg），人参 133.3mg（12 片中 400mg），半夏 333.3mg（12 片中 1000mg））

添加剂

二氧化硅，硅酸铝，羧甲基纤维素钙，硬脂酸镁，玉米淀粉

注意

本药剂使用生药作为原料，因此不同产品的颜色等会有所不同，但效果不会发生改变。

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）

- 下述人群不要服用
因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群。
因服用本药剂或其他感冒药、解热镇痛药而引发过哮喘的人群。
- 在服用本药剂期间，不要服用下述任何药物
其他感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药
- 请不要在服用前后饮酒
- 不要长期连续服用

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
正在接受医师或牙科医师治疗的人群。
孕妇或有其可能性的人群。
因药物等出现过过敏症状的人群。
拥有以下症状的人群。
高烧
接受以下诊断的人群。
心脏病，肝脏病，肾脏病，胃及十二指肠溃疡
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
皮肤：起疹、发红，发痒
消化系统：恶心、呕吐，食欲不振
精神神经系统：头晕

其他：体温过低

- 偶尔会出现如右文所述的重症。此时请立即就医。

休克（过敏性）：服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。

史提芬强生症候群、中毒性表皮坏死松解症、急性泛发性发疹性脓疱病：高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹、发红、发红皮肤上出现小脓包、全身无力、没有食欲等症状持续或急剧恶化。

药物超敏反应综合征：出现皮肤大范围发红、全身性起疹、发烧、身体疲倦、淋巴结（颈部、腋窝、腹股沟等）肿大等症状。

肝功能障碍：出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。

肾损伤：出现发烧、尿量减少、全身浮肿、全身无力、关节痛（各关节疼痛）、腹泻等症状。

间质性肺炎：上楼或因劳累而出现气短、气闷、空咳嗽、发烧，并且突然出现或长时间持续。

哮喘：呼吸时出现哮鸣音、气闷等情况。

- 若服用 5~6 次后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

- 保管在避免阳光直射潮气小的阴凉场所密闭。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）
- 请勿服用超过使用期限的产品。另外，即使在服用期限内，开封后请尽快服用完。（为了保证质量）

31

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。