

PABRON 50

- ◆ PABRON 50 정은 목의 통증 및 오한 등의 감기증상에 효과적인 양약 성분(아세트아미노펜, 구아야콜설폰산칼륨)과 목 점막을 부드럽게 해 가래가 나오기 쉽게 해주는 작용을 하는 생약성분 '맥문동탕 추출물'을 배합한 감기약입니다.
- ◆ 졸음이 오거나 입이 마르거나, 놀가 잘 안나오게 하는 성분(항비스타민약), 변비에 걸리기 쉽게 하는 성분(디히드로코데인인산염), 당뇨병 및 고혈압에 영향을 주는 성분(DL-메틸에페드린염산염, 마황)은 포함하지 않습니다.

효능

감기의 여러 증상(목 통증, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통, 가래)의 완화

용법 및 용량

다음의 양을 식후 가급적 30 분 이내에 찬물 또는 미지근한 물과 함께 복용하십시오.

15 세 이상, 1회 4정, 1일 3회

15 세 미만, 복용하지 말 것

주의

- 정해진 용법 및 용량을 엄수해 주십시오.
- 젖은 손 등으로 만진 정제는 병에 다시 넣지 마십시오.(변색 등의 원인이 되며, 품질이 변할 수 있습니다)

성분

4정종

아세트아미노펜 150mg

구아야콜설폰산칼륨 80mg

맥문동탕 건조 추출물 600mg

(아래 생약 건조 추출물)

(맥문동 533.3mg(12정 중 1600mg), 감초 133.3mg(12정 중 400mg), 간미 666.7mg(12정 중 2000mg), 대추 200mg(12정 중 600mg), 인삼 133.3mg(12정 중 400mg), 반하 333.3mg(12정 중 1000mg))

첨가물

무수 규산, 규산알루미늄, 카복시메틸셀룰로스 칼슘, 마그네슘스테아레이트, 옥수수 전분

주의

본제는 생약을 원료로 사용하고 있으므로 제품에 따라 색조 등 다소의 차이가 있을 수 있으나, 효과는 변함 없습니다.

사용상의 주의

해서는 안 되는 것

(자기지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용을 일으키기 쉽습니다)

● 다음에 해당하는 사람은 복용하지 마십시오

본제 또는 본제의 성분에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.

본제 또는 다른 감기약, 해열 진통제를 복용해 천식을 일으킨 적이 있는 사람.

● 본제를 복용하는 동안은 다음의 어떤 의약품도 사용하지 마십시오

다른 감기약, 해열 진통제, 진정제, 진해 거담제

● 복용 전후는 음주하지 마십시오

● 장기간 연속해서 사용하지 마십시오

상담할 내용

● 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.

임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람.

약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.

다음의 증상이 있는 사람.

고열

다음의 진단을 받은 사람.

심장병, 간장병, 신장병, 위·십이지장 궤양

● 복용 후 다음의 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

피부: 발진·발적, 가려움

소화기: 메스꺼움·구토, 식욕 부진

정신신경계: 현기증

기타: 과도한 체온 저하

●드물게 오른쪽과 같은 심각한 증상이 일어날 수 있습니다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

쇼크(아나필락시스): 복용 후 즉시 피부 가려움증, 두드러기, 목쉰소리, 재채기, 인후 가려움증, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타난다.

피부 점막안 증후군(스티븐스-존슨 증후군), 중독성 표피 괴사 융해증, 급성 범발성 발진성 농포증: 고열, 눈 충혈, 눈곱, 입술 진무름, 인후 통증, 피부의 광범위한 발진·발적, 빨개진 피부에 작고 도돌한 것(작은 농포)이 생김, 전신의 나른함, 식욕이 없는 증상 등이 지속되거나 급격히 악화된다.

간 기능 장애: 발열, 가려움증, 발진, 황달 (피부와 눈 흰자위가 노랗게 되는 증상), 갈색뇨, 전신의 나른함, 식욕 부진 등이 나타난다.

신장 장애: 발열, 발진, 소변량 감소, 전신 부종, 전신의 나른함, 관절통(마디마디가 아픈 증상), 설사 등이 나타난다.

간질성 폐렴: 계단을 오르거나, 조금 무리하면 호흡 곤란·숨이 참, 마른 기침, 발열 등을 보이며, 이들 증상이 갑자기 나타나거나 지속된다.

천식: 숨을 쉴 때 색색, 훑휙과 같은 소리가 나며, 답답함 등의 증상을 보인다.

●5~6회 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

보관 및 취급상의 주의

- 직사광선이 닿지 않는 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다)
- 사용기한을 경과한 제품은 복용하지 마십시오. 또한, 사용기한을 초과하지 않아도 일단 개봉한 후에는 가급적 빨리 복용하십시오.(품질유지를 위하여)

21

【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.