

# PABRON 50

- ◆PABRON 50 感冒錠為含有有效抑制喉嚨疼痛、畏寒等感冒症狀的西藥成分 (acetaminophen、potassium guaiaacolsulfonate) 以及具潤喉祛痰作用的天然藥材成分「麥門冬湯提取物」配方的感冒藥。
- ◆不含造成嗜睡、口乾、不易排尿的成分 (抗組織胺藥)、容易造成便秘的成分 (dihydrocodeine phosphate)、對糖尿病及高血壓產生影響的成分 (d/-Methylephedrine hydrochloride、麻黃)。

## 療效

舒緩各種感冒症狀 (喉嚨疼痛、畏寒、發燒、頭痛、關節疼痛、肌肉痠痛、痰涎)

## 用法及用量

請盡量於餐後 30 分鐘內以冷水或微溫水服用以下用量。

15 歲以上，1 次 4 錠，1 天 3 次

未滿 15 歲者，請勿服用

### 注意事項

- 請務必遵守規定用法、用量。
- 請勿將以濕手等直接觸摸的藥錠放回瓶內。(可能造成變色等影響品質)

## 成分

4 片中

乙醯胺酚 150mg

愈創木酚磺酸鉀 80mg

麥門冬湯乾燥萃取物 600mg

(下列天然藥材乾燥萃取物)

(麥門冬 533.3mg (12 錠中 1600mg), 甘草 133.3mg (12 錠中 400mg), 粳米 666.7mg (12 錠中 2000mg), 大棗 200mg (12 錠中 600mg), 人參 133.3mg (12 錠中 400mg), 半夏 333.3mg (12 錠中 1000mg) )

### 添加劑

二氧化矽, 矽酸鋁, 羧甲基纖維素鈣, 硬脂酸鎂, 玉米澱粉

### 注意事項

本藥劑採用天然藥材原料，因此產品色調可能稍有不同，但藥效不變。

## 使用上的注意事項

### 禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用)

- 下列的人請勿服用
  - 曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。
  - 曾服用本藥劑或其他感冒藥、解熱鎮痛藥，引發氣喘的人。
- 服用本藥劑期間，請勿使用下列任何一種醫藥品
  - 其他感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥
- 服用前後請勿飲酒
- 請勿長期連續服用

### 諮詢事項

- 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
  - 正在接受醫師或牙科醫師治療的人。
  - 孕婦或可能懷孕的人。
  - 曾因藥品等，引發過敏症狀的人。
  - 有下列症狀的人。
    - 發高燒
  - 接受過下列診斷的人。
    - 心臟病，肝臟病，腎臟病，胃潰瘍、十二指腸潰瘍
- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
  - 皮膚：發疹、發紅，發癢
  - 消化器官：噁心、嘔吐，食欲不振
  - 精神神經系統：頭暈

其他：過度的體溫低下

- 極少可能引發右列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

休克（過敏性）：服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。

史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死鬆解症、急性廣泛性發疹性膿疱症：發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹・發紅、變紅的皮膚上出現小顆粒（小膿疱）、全身倦怠、沒有食欲等持續，或者突然惡化。

藥物過敏症候群：皮膚廣泛性發紅，出現全身發疹、發燒、倦怠感、淋巴結（頸部、腋下、腹股溝等）腫大等。

肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。

腎功能障礙：出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛（各關節疼痛）、腹瀉等。

間質性肺炎：爬樓梯或稍微勉強身體，就會突然出現氣短・呼吸困難、乾咳、發燒等，或者持續這些症狀。

氣喘：呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。

- 即使服用 5～6 次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

## 保管及使用上的注意事項

- ・請保管於陽光直射不到濕氣少的陰涼處蓋緊。
- ・請置於兒童無法觸及之處保管。
- ・請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）
- ・請勿服用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早服用完畢。（為確保品質）

31

### 【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- ・本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- ・多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- ・多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- ・供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。