

효능 또는 효과

구강 내 및 인후의 살균·소독·세척, 구취 제거

용법 및 용량

1회 약 1mL(1푼푼)을 약 50mL(컵 약1/4양)의 물로 연하게 하여, 1일 수 차례 가글을 하십시오.
정해진 용법·용량을 엄수해 주십시오.
반드시 묽게 하여 사용하십시오.
소아에게 복용하게 할 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용하도록 하십시오.
가글링용으로만 사용하십시오.
본제는 사용할 때만 희석하고, 희석한 액은 빨리 사용하십시오.

성분 및 분량

In 100 mL
Cetylpyridinium chloride 0.25g
Dipotassium Glycyrrhizinate 0.25g
l-Menthol 0.25g

첨가물

Anhydrous ethanol, Brilliant blue, flavor,,

사용상의 주의

상담할 내용

다음에 해당하는 사람은 사용하기 전에 의사 또는 약사와 상담하십시오.
의사의 치료를 받고 있는 사람.
다음의 증상이 있는 사람.
구강내의 심한 진무를
다음과 같은 경우는 즉시 복용을 중단하고 이 제품을 지참한 후 의사 또는 약사와 상담하십시오.
사용 후, 다음의 증상이 나타난 경우
입:
자극감
5~6일간 사용해도 증상이 개선되지 않는 경우

보관 및 취급상의 주의

고온을 피하고 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 보관하십시오.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)
사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오.
플라스틱류, 도장면에 부착하면 변질될 수 있으므로, 부착하지 않도록 주의하십시오.
용기가 변형될 수 있으므로, 차 안 등 온도가 높아지기 쉬운 장소에 방치하지 마십시오.
화기에 가까이 두지 마십시오.

11

【OTC 의약품의 다언어 제품 정보에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가변역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다..