

2016年4月

大正製薬株式会社

パブロン鼻炎カプセルS α 及び
パブロン鼻炎カプセルS α 小児用
使用上の注意改訂のお知らせ

厚生労働省の指示により、パブロン鼻炎カプセルS α 及びパブロン鼻炎カプセルS α 小児用の使用上の注意を下記のとおり改訂いたします。

つきましては、改訂内容をご確認いただき、このような症状があらわれた場合には、適切な対応をお取りいただきますよう、お願い申し上げます。

記

<改訂内容>

改訂前	改訂後（ <u> </u> ：改訂箇所）				
<p>■相談すること</p> <p>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p> <p>.....</p>	<p>■相談すること</p> <p>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p> <p>.....</p> <p><u>まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</u></p> <table border="1"><thead><tr><th>症状の名称</th><th>症状</th></tr></thead><tbody><tr><td>急性汎発性 発疹性膿疱症</td><td>高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。</td></tr></tbody></table>	症状の名称	症状	急性汎発性 発疹性膿疱症	高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
症状の名称	症状				
急性汎発性 発疹性膿疱症	高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。				

以上