

◆PABRON鼻炎胶囊 Sa是1天服用2次就有显著效果的内服鼻炎药。■快速溶化后开始发挥药效的白色颗粒和慢慢溶化后在后面发挥药效的橙色颗粒，对严重的鼻炎症状发挥显著的效果。

效能或效果

缓解因急性鼻炎、过敏性鼻炎或副鼻窦炎引起的下述各症状：打喷嚏、鼻涕（鼻涕过多）、鼻塞、泪眼、咽喉疼痛、头重（头部沉重）

用法及用量

每12小时，请按以下用量并配合水或温开水服用：

15岁以上，1天2次，1次2粒胶囊

未满15岁，不宜服用

请严格遵守规定的用法用量。

•胶囊的取用方法

•用指尖用力按下装有胶囊的PTP板的凸出部，弄破背面的铝箔再取出服用。（以包装的状态直接误吞，会发生穿破食管粘膜等意外事故）

成分及分量

2粒胶囊中

Pseudoephedrine hydrochloride 60mg

Carbinoxamine maleate 6mg

Belladonna total alkaloid 0.2mg

Anhydrous caffeine 50mg

添加剂

Magnesium aluminometasilicate ,Sugar,Corn starch ,Hydroxypropylcellulose,Magnesium stearate,cellulose,Talc,Ammonio alkyl methacrylate copolymer,Stearyl alcohol ,Sorbitan trioleate,Sunset Yellow FCF ,Gelatin,Sodium lauryl sulfate

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故）

下述人群请不要服用

因为本药剂或本药剂的成分引起过过敏症状的人群。

拥有以下症状的人群

前列腺肥大导致排尿困难

接受以下诊断的人群

甲状腺功能障碍

心脏病

高血压

糖尿病

在服用本药剂期间，不要服用下述任何药物。

其他鼻炎用内服药、含抗组胺剂的内服药等（感冒药、镇咳祛痰药、晕车药、抗过敏药等）、肠胃镇痛镇痉药

含有pseudoephedrine hydrochloride或pseudoephedrine sulfate的内服药

●服用后不要驾驶交通工具或操作机械类（会出现嗜睡、视线模糊、异常眩光等症状）

●不要长期连续服用

咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师治疗的人群

孕妇或有其可能性的人群

哺乳期人群

老年人

因药物等出现过过敏症状的人群

因感冒药、镇咳祛痰药、鼻炎用内服药等出现过失眠、头晕、乏力、发抖、心悸等症状的人群

拥有以下症状的人群

高烧

排尿困难

接受以下诊断的人群

青光眼

肾脏病

接受单胺氧化酶抑制剂（盐酸司来吉兰等）治疗的人群。

（Selegiline hydrochloride用于治疗帕金森病）

●服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

皮肤：

起疹、发红

发痒
消化系统：
恶心
呕吐
食欲不振
精神神经系统：
头晕
失眠
神经过敏
头痛
痉挛
泌尿系统：
排尿困难
其他：
脸部灼热
异常眩光

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

急性泛发性发疹性脓疱病：高烧、皮肤大范围起疹、发红、发红皮肤上出现小脓包、全身无力、没有食欲等症状持续或急剧恶化。

●服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

口腔干燥、嗜睡、便秘、视线模糊

●若服用5~6次后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）

请勿服用超过使用期限的产品。此外，即使在使用期限内，开封后请在6个月以内服用。（为了保证质量）

21

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

·本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。

·多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。

·多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。

·关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担一切责任