

# PABRON RHINITIS CHEWABLE TABLETS

指定第二类医药品  
鼻炎药

◆PABRON鼻炎速溶药片是在口中快速溶化的，对于急性鼻炎症状发挥显著效果的内服鼻炎药。■无水也可服用，不管在什么场合都可以简单服用。●带有散发清凉感的薄荷醇味。

## 效能或效果

缓解因急性鼻炎、过敏性鼻炎或副鼻窦炎引起的下述各症状：打喷嚏、鼻涕（鼻涕过多）、鼻塞、泪眼、咽喉疼痛、头重（头部沉重）

## 用法及用量

请按以下用量在口中咬碎或溶解后服用。但是，服用间隔时间为4小时以上。

15岁以上，1天3次，1次2片

7岁~14岁，1天3次，1次1片

未满7岁，不宜服用

请严格遵守规定的用法用量。

儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。

药片的取用方法

·如图所示用指尖用力按下装有药片的PTP板的凸出部，弄破背面的铝箔再取出服用。

·（以包装的状态直接误吞，会发生穿破食管粘膜等意外事故）

## 成分及分量

2片中

Pseudoephedrine hydrochloride 60mg

Carbinoxamine maleate 4mg

Belladonna total alkaloid 0.2mg

Anhydrous caffeine 50mg

## 添加剂

anhydrous silicic acid ,Corn starch ,Powdered sugar,D-Mannitol ,Hydroxypropylcellulose,Croscopovidone,Sucralose ,Mentha oil ,l-Menthol,Calcium stearate,flavor,Starch sodium octenyl succinate

## 使用注意事项

### 禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故）

下述人群请不要服用

因为本药剂或本药剂的成分引起过过敏症状的人群。

拥有以下症状的人群

前列腺肥大导致排尿困难

接受以下诊断的人群

甲状腺功能障碍

心脏病

高血压

糖尿病

在服用本药剂期间，不要服用下述任何药物。

其他鼻炎用内服药、含抗组胺剂的内服药等（感冒药、镇咳祛痰药、晕车药、抗过敏药等）、肠胃镇痛镇痉药

含有pseudoephedrine hydrochloride或pseudoephedrine sulfate的内服药

●服用后不要驾驶交通工具或操作机械类（会出现嗜睡、视线模糊、异常眩光等症状）

●不要长期连续服用

### 咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师治疗的人群

孕妇或有其可能性的人群

哺乳期人群

老年人

因药物等出现过过敏症状的人群

因感冒药、镇咳祛痰药、鼻炎用内服药等出现过失眠、头晕、乏力、发抖、心悸等症状的人群

拥有以下症状的人群

高烧

排尿困难

接受以下诊断的人群

青光眼

肾脏病

接受单胺氧化酶抑制剂（盐酸司来吉兰等）治疗的人群。

（Selegiline hydrochloride用于治疗帕金森病）

●服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

皮肤：

起疹、发红

发痒

消化系统：

恶心

呕吐

食欲不振

精神神经系统：

头晕

失眠

神经过敏

头痛

痉挛

泌尿系统：

排尿困难

其他：

脸部灼热

异常眩光

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

急性泛发性发疹性脓疱病：高烧、皮肤大范围起疹、发红、发红皮肤上出现小脓包、全身无力、没有食欲等症状持续或急剧恶化。

●服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

口腔干燥、嗜睡、便秘、视线模糊

●若服用5~6次后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

## 保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）

请勿服用超过使用期限的产品。此外，即使在使用期限内，开封后请在6个月以内服用。（为了保证质量）

31

### 【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

·本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。

·多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。

·多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。

·关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任